FLORÆ AUSTRIACÆ

VOLUMEN QUINTUM,

CONTINENS

ICONUM

CENTURIAM QUINTAM.

FOLIO
QK318
.523
1778
v.5

FLORÆ AUSTRIACÆ,

SIVE

PLANTARUM SELECTARUM

IN

AUSTRIÆ ARCHIDUCATU

SPONTE CRESCENTIUM,

ICONES,

AD VIVUM COLORATÆ, ET DESCRIPTIONIBUS,

AC

SYNONYMIS ILLUSTRATÆ.

VOL. V.

OPERA AC SUMPTIBUS

NICOLAI JOSEPHI JACQUIN.

VIENNÆ AUSTRIÆ,

TYPIS JOSEPHI MICHAELIS GEROLD,

AULÆ IMPERIALIS TYPOGRAPHI.

MDCCLXXVIII.

Mo. Bot. Gàrden,
1895.

In tabula tituli proponuntur montes cum arce templariorum dicuta in vicinia oppidi Medling, variorsibus planis divites.

TABULA QUADRINGENTESIMA PRIMA.

CYCLAMEN EUROPÆUM. *Linn. syst. p. 251.*
Cyclaminus europæus. *Scop. carn. 1. pag. 136.*
Cyclaminus flore cernuo, segmentis sursum reflexis. *Hall. hist. helv. num. 635.*
Cyclaminus. *Gun. opif. pag. 357.*
Cyclaminus odorato purpureo flore. *Clus. hist. pag. 264.*

Radix rotundum sitit depressulumque tuber, carnosum, intus album, foris fuscum, fibris exilibus undique juxtarum & perenne, ex quo intra terram veluti caulículus brevior, & ex hoc cum folia tum pedunculi sive scapi uniflori egrediuntur. Folia sunt ex reniformi subrotunda, obtusissima, obsolete crenulata, supra saturate virentia maculataque, subtus plerumque ex rubro purpurea, glabra, donata petiolo longissimis coccineis & rubentibus. Pedunculi petiolis sunt similes, eriguntur in flore, in fructu spiraliter contorquentur ad tellurem usque. Flores cernui & suaveolentes calycem habent campanulatum viridem. Peralum elegantes purpureum cum collo saturatiore dividitur in laciniis obtusiusculis & planis. Filamenta inseruntur fundo tubi corollæ. Antheræ magnæ flavent, inque cunam circum germen connivent. Stylus albus tubum petali longitudine æquat. Capsula coriacea & purpurascens ad apicem primo, dein tota quanta multivalvis dehiscit. Receptaculum hemisphæricum, carnosum, molle, albidumque, in centro capsulæ locatur, proprio pedicello sustentatum. Eidem semina externe adhærent plurima, magna, rufa & subreniformia. Crescit passim in sylvis subalpinis, cum etiam quibusdam in aliis demissis; florens Aprili Majo & iterum Augusto. Ad imaginem tabulæ capsula expansa cum receptaculo; dein semina repræsentantur.

TABULA QUADRINGENTESIMA SECUNDA.

DIPSACUS SYLVESTRIS. *Dod. pempt. 5. l. 5. c. 16. Blackw. t. 50.*
Dipsacus fullonum. α. *Linn. hist. p. 120. Scop. carn. 1. p. 97.*
Dipsacus capitulis ovatis, caule foliis arcuatis circumvallato, aristis squamarum rectis. *Hall. hist. helv. num. 198.*

Dipsacus sylvestris aut viega pastoris major. *Raub. pin.* 385. *Moris. hist.* 3. *p.* 168. *s.* 7. *t.* 36. *f.* 3.
Labrum Veneris sponte proveniens. *Lob. ic. alt.* 18.
Labrum Veneris alterum. *Cam. epit.* 452.

Ex radice fusiformi, digitum crassa, perpendiculari, saepe vel pedem longa, fusca & intus albida, lignosa, & dura, primo anno sola folia radicalia producunt, altero sine his caulis unicus, quando planta post maturatum fructum emoritur. Folia sunt oblonga, opposita, acuta, primi anni obtusiora, obtuse & inaequaliter crenato-serrata, glabra, supra pedalia; nervo medio antice pallente; subtus prominente unaque cum paucis venis lateralibus in spinulas recurvas albidas & subtriangulares elevato. Folia summa sunt sessilia, integriora, lanceolata, & distincta; reliqua sunt basibus suis lace connata; & hinc post pluvias aquam copiose continent, avibusque in potum. Caulis erigitur ad humanam altitudinem, fistulosus cum nodis imperviis, basi teres, dein angulatus, cum striatus, spinulis rectis, quales in folia, torus hirridus, superne ex alis ramulos, inque pedunculos longos erectos & unifloros terminatus. Flores colligantur in capitulum densum, ovatum, erectum; in ramis aut plantis magis pumilis quandoque subrotundum. Squamae sub flosculis carinatae, albae, superne ciliatae & virescentes, atque hinc excurrentes in mucronem aristarum rectum & vix pungentem. Involucri foliola a decem ad viginti, rigidula, falcata, mucronata, integerrima, magis minusve latum arcuata, dorso & ad oras inferne spinulosa, longitudine omnino valde inaequalia, extima quoddam longissima. Flosculi numerosissimi, aequales, florent, qui in medio sunt, primi, atque dein superiora & inferiora versus successive prosiunt. Pericarpium proprium tetragonum, compressato-pacentissimum, ore ciliatum, viride, exiguum, medio germini infidet. Hoc tegitur ab interno, tetragonum, villosissimo, oblongum, album, ore multicrenato. Pereli calyx longe infundibuliformis, albus; limbus quadrifidus, patens, brevis: laciniis subrotundis, obtusis, integris, purpureis, infima longiore. Antherae caeruleae. Semina receptaculo communi oblongo insident, columnatim, ferina, fusca, glabra. Crescit in herbidis ad fossas, rivulos. Floret a fine Julii ad Septembrem. Vis in cutis sanandis capiendi recte perstant; quare a Dipsaco folienum separavi.

TABULA QUADRINGENTESIMA TERTIA.

DIPSACUS LACINIATUS. *Linn. syst. pag.* 120. *Hall. hist. helv. num.* 198. *a.*
Dipsacus folio laciniato. *Raub. pin.* 385. *Morit. hist.* 3. *p.* 158. *s.* 7. *t.* 36. *f.* 4.

Planta biennis cum priore Dipsaco crescit & floret, ab hac tamen vere diversa, & cultu non tractabilis, cujus sufficias sola adducere discrimina. Folia caulina sunt pinnatifide laciniata, laciniis oblongis vel lanceolatis. Summa tamen integra, & ad magis connata. Paleli laciniae non purpureae, sed constanter pallide carneae sunt; & antherae pallent.

TABULA QUADRINGENTESIMA QUARTA.

ARENARIA VERNA. *Linn. syst. pag.* 313.
Alsine alpina glabra tenuissimis foliis, floribus albis. *Herm. par. pag.* 12. *tab.* 12.

Frequentissima in collibus graminosis siccis occurrit, florens Maio & Junio. Radix perennis, longa, subamara, pallida, ramosa, & multiceps, plurimos annuum caulesculos promit hebetaceos, teretes, erectiusculos, gracilos, a tribus ad sex uncias altos, inferne gla-

glabros, superne dense hirsutulos perque plures dichotomias patentes ramosos. Pedunculi hirsuti terminant ramulos, & solitarii etiam alii in dichotomiis locantur. Folia radicalia & caulina sunt sessilia, acuta, glabra, opposita, & recta. Ad ramos autem lanceolata, acuta, concava, & breviora. Calycis foliola sunt lanceolata, acuta, concava, pilis subcapitatis hirsutula, lineis albidis interne magis conspicuis notata. Petala subovata, albida, patentissima, calycem ad unam tertiam partem superant. Filamenta subulata, alba. Antherae luteae. Germen ovatum. Styli albi. Capsula conica, glabra, fuliacea, longitudine calycis. Semina reniformia, compressa, fusca, ad octodecim. Pilos, nudo oculo aegre notandos, sculptor in icone omisit.

TABULA QUADRINGENTESIMA QUINTA.

LEONURUS MARRUBIASTRUM. *Linn. syst. pag.* 396. *Scop. carn.* 2. *p.* 409.
Marrubiastrum foliis cardiacae. *Bocc. mus.* 2. *p.* 120. *t.* 98.

Planta biennis vel annua, exiguo lamii odore, ex radice ramosa fibrosa & albida caulem unum alterumve attollit tripedalem (culta etiam duplo altiorem) tetragonum, erectum, foliosum & ramosum. Folia sunt lanceolata, opposita, petiolata, acuminata, serrata, venosa; caulina inferiora in cultis rotundato-ovata & magis [illegible]. Caulis, rami, calyces, corollae, [illegible] pagina subtus villis mollibus sunt, ad solum microscopium bene conspicuis. Verticilli circiter vigintiflori, fulciti involucro polyphyllo, bracteis setaceis spinosis. Flores sunt parvi. Calycis quinque denticuli in spinulam rigidam abeunt. Petali carnei faux longa supra calycem valde incurvatur. Galea rotundata. Labii inferioris laciniae laterales semiovatae; intermedia duplo major & subrotunda. Antherae subovatae, fordide virentes, dulcamarae, teretes, nullis punctis adspersae. Reliqua ad clarissimum Linnaeanum. Crescit haud frequens in cultis, ad pagos. In Hungaria frequentior. Floret a Julio ad Septembrem.

TABULA QUADRINGENTESIMA SEXTA.

POTENTILLA SUPINA. *Linn syst. pag.* 350. *Crantz. a.* 2. *p.* 149. *t.* 27. *f.* 2.
Fragaria supina. *Crantz. [illegible] pag.* 73.
Pentaphylloides supinum, Tormentillae facie. *Cat. hg. p. CVIII.*
Pentaphyllum supinum, Tormentillae facie. *Joh. ic.* 692.
Pentaphyllum supinum [illegible]. *Park. elm.* 285. *t.* 106 *f.* 7.
Quinquefolia [illegible]. *Bauh. pin* 326.

Ex radice saepe plus quam annua, ramosa, longa, foris fuscescente & intus alba caules in ambitum sparguntur herbacei, prostrati, semipedales vel duplo longiores, teretes, saepe rubentes, hirsutuli, dichotomi. Folia radicalia & caulina sunt pinnata & petiolata; summa ternata & saepe subsessilia: foliolis ad lentem hirsutis, oblongis vel ovatis, obtusis, terminatis, utrinque virentibus, dorso pallidius. Stipulae ovatae, acutae, integerrimae vel tantum serratae. Pedunculi folitarii & uniflori in dichotomiis, in floribus subrecti, in fructibus retroflexi. Calycis subpilosi foliola decem subaequalia virent. Petala calycem vix superantia, obtusissima, & versus basim angustiora, flavent. Genitalia corollae sunt conformia. Semina ex ovato subrotunda, rugosa. Crescit in cultis, ad aggeres, prata, & alibi. Primo aetatis anno floret ab Augusto ad Octobrim, altero jam Majo.

TABULA QUADRINGENTESIMA SEPTIMA.

GYPSOPHILA REPENS. *Linn. syst. pag.* 306.
Saponaria radice lignosa, maxima; foliis glaucis, pulposis; floribus emarginatis. *Hall. hist. helv. num* 905.
Caryophyllus saxatilis, foliis gramineis, minor. *Bauh. pin.* 211. *Barr.* 11. 126.

Tota glabra est. Ex radice sublignosa, subfusiformi, longissima, digitum minimum crassa, intus albida, foris fuscescente, insipida, fibris aucta, & admodum multicipite, caules exoriuntur numerosi, dense cespitosi, prostrati, perennantes; ex quibus annuatim enascuntur rami herbacei, erecti, a tribus ad sex uncias alti, simplices, ad genicula purpurascentes, superne in paniculam imperfecte trichotomam soluti. Folia sunt ex lanceolato linearia, acuta, glauca, crassa, sessilia, opposita, uncialem longitudinem rarissime attingentia. Calycis lacinia sunt lanceolatae, acuminatae, concavae, cum linea media longitudinali atrovirente vel purpurascente, cumque oris membranaceis albidis. Corollae subcampanulatae cum limbo patentissimo petala sunt versus basin paulatim attenuata, plana, magis minusve emarginata, utrinque nivea, & calycem superantia ad duplum. Filamenta alba patent, petalis haud multo breviora. Antherae didymae, subrotundae, initio albidae, deinde subviolaceae. Crescit in alpibus. Floret Septembri. Clarissimus Schivereck ex alpibus Tyrolensibus mihi plantam misit, floribus dilutissime roseis, quam nullo alio possim momento ab illa distinguere. An alterutra sit Gypsophila prostrata Linnaei? Et alterum forte mera varietas?

TABULA QUADRINGENTESIMA OCTAVA.

SALIX ARBUSCULA. *Linn. syst. pag.* 648 *flor. suec. pag.* 348. *flor. Lapp. num.* 352. 360. & 360. *Gunn. fl.* 1. *num.* 21. *f.* 166.

Frutex oblongus, ramosus valde, decumbens partim, partimque adscendens aut erectus, pedem unum altitudine aequans, trunco digitum crassus, cortice ex fusco cinerascente obductus, etiam et ramis, qui rectum rubent, cortice tegit. Folia sunt inverse ovata, acuta vel obtusa, breviter petiolata, tenuia, facie laete virentia & splendentia, subtus venosa cinerea nitidaque, utrinque glabra, leviter serrata serraturis ad lentem cartilagineis rotundatis ac fuscis, iisque saepe perpaucis, aut, ut vix appareant, exiguis, raro alias integerrima. Petioli quandoque raros pilos habent. Ad novellos ramulos stipula altius lirata, bifida, nitida, lata, emarginata, amplexans, eadem decidua. Pedunculi hirsuti amenta sustinent cylindrica. Flores dioici. Calycis squama ovata dorso nigrescit, pilis albis longisque subtus hirsuta & ad oras ciliata. Crescit in alpibus, ubi floret Junio. Exsiccatus odorem aliquem habet. Cum trunci ramosi parte ex stirpe feminea exhibetur etiam pars ramuli masculini; tum seorsim stipula vi expansa; & aucta calycis squamula. In icone serratura quibusdam in foliis manifesta nimis est, quam oculis haud ita percipiatur; sed sculptor hoc vitium vix evitat in foliis minimum serrulatis; nam aut integerrima illa sculpit, oportet, qualia, etiamsi vel oscitanter spectata, credi possent; aut nimis illa profunde secabit.

TABULA QUADRINGENTESIMA NONA.

SALIX FUSCA. *Linn. syst. pag.* 649.
Salix pumila, folio utrinque glabro *Bauh. hist.* 1. *p.* 217

Radix lignoſa, longa, digitum minimum craſſa, intus albida, foris ex rufo fuſca, caules ſparge plures, glabros, nigreſcentes, ramoſos, procumbentes & fruticoſos. Rami juniores breves & valde hirſuti virent. Folia ſunt lanceolata vel obverſe ovata, acuta vel acuminata, rarius obtuſa, integerrima, alterna, breviter petiolata, verſus petiolum attenuata, utrinque lucida, facie glabra, dorſo glabro vel tenuiſper piloſa, idque imprimis ad nervum medium, venisque reticulata minutiſſimis, ad oras lanuginoſa, laete virentia. Pedunculi pilis albis mollibuſque denſe veſtiuntur. Amenta ſunt cylindrica, erecta, & ad baſin foliis minoribus inſtructa. Squamæ ſunt lanceolato-acuminatæ & piloſiſſimæ. Capſulæ acutæ & rufæ. Maribus flores diandri. Tota planta ſapore pallet valde aſtringente. Crescit in alpibus. Floret Majo. Fructeſcit Julio. Fœminæ fructeſcentes ſiſtuntur duæ varietates, altera minor, altera foliis julisque majoribus, utraque ſylveſtris; tum ramulus maſculus.

TABULA QUADRINGENTESIMA DECIMA.

HIERACIUM AURANTIACUM. *Linn. ſyſt. pag.* 523.

Hieracium caule ſubnudo; foliis ovatis, integris; floribus umbellatis, aurantiis. *Hall. hiſt. helv. num.* 50.

Hieracium germanicum. *Col. ecphr. 1. p.* 28. *t.* 30.

Hieracium non laciniatum alpinum, flore fuſco. *Bauh. pin. 128. prodr.* 65.

Piloſella polycnemos repens major ſyriaca, flore ampio aurantiaco. *Moriſ. hiſt. 3. p.* 78. *t.* 7. *f.* 8. *f.* 7.

Lactescit tota. Radix perennis, ramoſa, per ſtolones intra terram repentes novas plantas producit. Folia radicalia plura, in orbem poſita, lanceolata, acuta, viridia, denticulata, pilis rigidulis & inermis utrinque denſe veſtita. Caules pauci, erecti, lineati, teretes, plus minus pedales, uno alterove folio ſimili inſtructi, quandoque plane aphylli, pilis etiam ex atro bulbillo ortis hirſuti, ſuperne in pedunculos aliquot corymboſe dividuntur. Flores ſuavi odore violarum pollent, atque adamuſim cum clariſſimo Linnæano congruunt. Calyx artis pilis totus obſitus. Corollulæ profunde quinquedentatæ colore compreſſæ ſunt utrinque ſaturate & eleganter aurantiaco. Antheræ & ſtyli flavent. Semina ſtriata & nigra pappo coronantur pulcro. Crescit in ſubalpinis. Floret Majo & Junio.

TABULA QUADRINGENTESIMA UNDECIMA.

CAMPANULA THYRSOIDES. *Linn. ſyſt. p.* 160. *Jacq. vind. pag.* 241. *Obſ. bot. cent. 1. pag.* 33. *tab.* 61. *Scop. carn. 1. pag.* 148.

Campanula foliis lingulatis, aſperis; floribus hirſutis, denſiſſime ſpicatis. *Hall. hiſt. helv. num.* 688.

Campanula foliis ecbii. *Bauh. pin.* 94.

Trachelium thyrſoides *Clus. hiſt. pag. CLXXII.*

Alopecurus alpinus quibusdam, Echium montanum Dalechampii. *Bauh. hiſt. 2. pag.* 809.

Radix albida, digitum minimum craſſa, aliquot uncias longa, ramis emiſſis aucta, primis annis folia numerosa in elegantem rosam expanſa promit, tandem caulem, quando poſt fructus maturatos perit. Folia omnia ſunt oblongo-lineata, integerrima, ſeſſilia, aſpera, pilosa, ciliata, tres quatuorve uncias longa, ſuperiora ſucceſſive breviora magisque acuta, tandem ſquamas referentia, dum omnes flores in apicem ſpicæ usque cumpluuntur. Caulis erectus, ſimpliciſſimus, ſolcus, a dimidio pede ulterà ſeſquipedem longus in diverſis individuis,

duis, totus foliis vestitus densissime, angulatus, purpureus, & pilis candicantibus hirsutus, in spicam foliosam longam abit. Bracteæ ad flores geminæ, pallidæ, acutæ, ciliatæ, elongato-lanceolatæ. Flores sessiles, omnino numerosi, axillares, grate suboderati, solitarii, & in inferioribus foliis quandoque bini vel terni. Calyx viridis, pilosus, tubo corollæ brevior vel æqualis, in lacinias quinque lanceolatas dividitur. Corolla alba, intus & ad oras lanuginosa; laciniis semiovatis. Nectarii valvulæ lanuginosæ. Germen inferum. Stylus superne hirsutus. Stigma trifidum virescit. Capsula obverse ovata & trilocularis est. Crescit in pratis subalpinis. Floret Julio. Fructus Augusto maturescit. Icon plantam sylvestrem majorem sistit, Augusto ineunte lectam, quando medii flores jam in fructum abeunt, & soli adhucdum pauci in vertice & in infima spicæ parte vigent. Ad latus habetur flos singularis cum bracteis suis.

TABULA QUADRINGENTESIMA DUODECIMA.

POLYGALA AMARA. *Linn. syst. p. 470. Scop. carn. 2. p. 48. Crantz. fasc. p. 438.*
Polygala procumbens, foliis imis subrotundis, supremis lineatibus. *Hall. hist. helv. num. 343.*
Polygala buxi minoris folio, flore cæruleo. *Vaill. par. p. 161. t. 32. f. 2.*
Polygala vulgaris, foliis circa radicem rotundioribus, flore cæruleo, sapore admodum amaro. *Bauh. pin. 215.*

Tota planta glabra est, & prata atque pascua, imprimis alpina, incolit. Radix perennis, lignosa, tenuis, semipedalis, ex fusco pallens, & fibris aucta, sapore gaudet subaromatico & amaro, odore autem vix ullo. Multiceps in cauliculos breves procumbentes plures in cæspitem sæpe densum dispescitur, rosulam gerentes foliorum, quæ sunt obverse ovata, etiam acutiuscula, tenuia, crassiuscula, versus basin attenuata, amarore prædita intenso, tibique diu inhærente. Caules herbacei, subrecti, semipedales vel breviores, etiam subramosi, angulati, foliis vestiti sparsis, angustis sublanceolatis, acutis, saporis ejusdem; ceterum simplicissimi, rarissime ramosi, terminati racemo florum plerumque ex cæruleo violacearum, paucioribus in individuis ex purpureo rubentium. Calycis, corollæ concoloris, foliola sunt ferme æqualia, oblonga, concava, petalis fere duplo breviora. Corolla ut in vulgari. Fructus etiam similis.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA TERTIA.

POLYGALA MAJOR. *Bauh. pin. 215.*
Polygala vulgaris major. *Clus. hist. pag. 324.*

Cum Clusio hanc plantam a Polygala vulgari separo; quæ per totam Austriam vulgatissima, præterquam quod colore florum valde variet, semper constans in habitu suo, nunquam ad majorem illam accedit, montanam plantam, elegantissimam, sabulosa cretacea & sicca loca amantem. Si tamen varietatem quis velit, nam certe nullam (si staturam & magnitudinem partium excludas,) discriminis notam, aliam adferre possum, spectabilis tamen varietas seorsim tradi meretur. Tota est glabra. Ex radice lignosa, perenni, calamum & ultra crassa, sordide pallente, subodorata, & sapore prædita aromatico forti ac singulari, plures annuatim caules herbacei exsurgunt, plerumque simplicissimi, a dimidio ad totum pedem alti, dense foliosi, teretes, suberecti, in racemos longos terminati. Folia sunt crassiuscula, lineari-lanceolata, sessilia, acuta, integerrima, sparsa, suberecta, saporis herbacei. Flores inodori, toti quanti una cum pedicellis eleganter rubropurpurei, ante explicationem

erigunturque, dein patent, tandem in fructu pendula. Calyx & alæ in fructu virent cum fructibus purpureis. Calycis foliola obtusiuscula ciliis ad oras albis gaudent. Vexilli diphylli lunulæ sunt ovales, munus incumbentes in formam ovato-concavam; ungues angusti longissimi & tubo carinæ arcte appressi. Carina tubulosa cum appendice multifida. Germen pedicellatum. Capsula obverse cordata, compressa, bilocularis, bivalvis dehiscens. Semina solitaria, cereia, fusca, pilis albis retrorsum hispidula, recta in apice hilo albo orbiculo. Floret Majo & Junio. Ad latus tabulæ exhibentur ala, capsula, semen; idemque auctum.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA QUARTA.

MYAGRUM PERENNE. *Linn. syst. p. 432. Scop. carn. 2. p. 10.*
Myagrum biarticulatum. *Crantz. fasc. pag. 6.*
Myagrum siliculæ articulo primo striato, altero globoso striato. *Hall. hist. helv. num. 525.*
Rapistrum monospermum. *Bauh. pin. 95. prodr. 37. Mapp. alt. p. 266.*

Inter segetes inque pratis Danubio vicinis crescit, florens Junio, perficiens Julio semina. Radix perennis, digitum vel pollicem crassa, teres, longissima, fordide pallens, intus alba, sapore gaudet raparum, sed simul valde acri. Caulis unicus, bipedalis & ultra, angulatus, medulla alba farctus, subteretus, inferiora versus pilis albis reflexisque hispidus, supra medium in ramos quam maxime est paniculatus. Folia sunt pinnatifida, acuta, petiolata, dentata, utrinque aspera; laciniis acutis. Flores numerosissimi. Calycis foliola oblonga, obtusa, concava, & erectiuscula, cum flavedine virent. Petala lutea, patentia, obverse ovata, obtusissima, & calyce duplo longiora, paulatim abeunt in unguem tenuem. Filamenta & antheræ colorem calycis habent; hæ oblongæ, tandem fuscæ. Siliculæ rugosæ articulus superior est ovatus stylogue rostratus. Inferior oblongus, angulatus, cellulosus. Uterque unilocularis & multispermus.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA QUINTA.

PRIMULA AURICULA. *Linn. syst. p. 150. Scop. carn. 1. p. 133.*
Primula umbelliferæ foliis ciliatis, glabris, carnosis. *Hall. hist. helv. num. 612.*
Auricula ursi. *Cam. epit. p. 706.*
Sanicula alpina lutea. *Bauh. pin. 242.*

In alpibus Austriæ frequens planta, semper occurrens floribus luteis & odoratis, nunquam cæruleis aut purpureis, licetumque eadem colorem, culta jam per plurimos annos in horto, servans constantissime. Radix perennis rapium ritaris & fusois innascitur, catanti vel digiti crassitie, foris fusca, fibrillis albidis crebrisque aucta, sæpe multiceps. Folia promit plura, obverse ovata, versus basin angustata, obtusa, sessilia, crassa, ratione plantulæ sesquialtia vel sesquidupla, tota glaberrima vel subtilissime villosula, simulque pulvere albido veluti adspersa, magis minusve supra medium dentato-serrata. Scapus axillaris, subteres, erectus, glabet, terminatus umbella floruin a quatuor ad duodecim. Foliola involucri sunt pauca, ovata, brevia. Perianthium subovatum, teres nec angulatum, brevissimum. Corollæ tubus calyce multo longior, cylindricus absque ullo peculiari collo. Limbi subinfundibuliformis & ultra medietatem divisi laciniæ sunt magis minusve profunde emarginatæ. Antheræ luteæ. Capsula globosa, magnitudine calycis. Semina numerosa maturescunt sub finem Augusti. Floret Junio.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA SEXTA.

THESIUM ALPINUM. *Linn. syst. pag.* 188. *Jacq. vindob. pag.* 213. *Scop. carn.* 1. *p.* 114.

Thesium caule diffuso, floribus alaribus, foliis linearibus. *Hall. hist. helv. num.* 1574.

Thesium floribus subsessilibus, pedunculis foliosis, foliis linearibus. *Ger. gallopr. pag.* 442. *t.* 17. *f.* 1.

Alchimilla alpina linariæ foliis, calyce florum albo in foliorum alis. *Till. pis.* 6.

Linophyllum alpinum, flore fructuque per ramulos perbreves cauli adhærentibus. *Ponted. anth.* 262.

Ex radice sordide albicante, nec crassa caules generantur plures, herbacei, procumbentes, varius erectiusculi, a tribus ad novem uncias longi, teretes, & frequentius simplices. Hos interne folia ornant sine ordine sparsa, sessilia, ex lanceolato linearia, plana, acuta, integerrima, plus minus uncialia. Superior caulium pars in racemos simplices elongatur, quorum proprii pedunculi teretes breves foliolisque tribus sessilibus terminati hos inter florem unicum sessilem (rarissime gemellos) gerunt. Ex foliolis illis lateralia opposita duo sunt tertio multo breviora. Perianthii persistentis tubus est infundibuliformi-oblongus & deorsum angustatus. Laciniæ virentes foris, intus niveæ, crassulæ, subovatæ, patentissimæ, tandem se erigentes & conniventes. Filamenta alba tubum vix superant, antheris donata subrotundis. Funiculus est brevior pedunculatus. Flores in hac specie sunt plerique terrandri, rarius quinquefidi; quorum numerum lacinix calycis sequuntur. Tota planta glabra est. Crescit pratis in graminosis subalpinis; tum etiam in aliis herbidis editis locis, nec hac varietas, quæ prima intuitu a Thesio Linophyllo dignoscas. Floret Junio & Julio.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA SEPTIMA.

TEUCRIUM SUPINUM. *Linn. syst. p.* 388.

Polium montanum supinum minimum. *Lob. ic.* 488.

Polium montanum repens. *Bauh. pin.* 220.

Polium pannonicum septimum cum semine. *Clus. hist. pag.* 363.

Trita inter digitos tota planta aromatica gratique est odoris; sapore prædita amaro & parumper aromatico. Radix perennis, lignea, calamum & ultra crassa, fusca vel nigrescens, cauliculos in circum plures spargit, fruticosos, ramosos, perennantes. Rami teretes, annui, adscendentes, semipedales, ad lentem villosuli. Folia sunt opposita, lanceolato-linearia, acutiuscula, integerrima, subsessilia, facie viridia & glabra, dorso subrugosula & villoso-incana, ad oras leviuscule revoluta. Capitula florum densa, terminalia & erecta, sunt ex foliis minoribus numerosis confertissimis, floribusque eorundem axillaribus & brevissime pedunculatis; in fructu magis elongata & spicæformia. Calyx longe mucronatus viret cum suffusa sæpe purpura. Petali albi sissum labium superius venas monstrat ad lentem eminentes & fuscas oraque ciliatas. Antheræ ovatæ, subdidymæ, punctatæ, bivalves; post dehiscentiam badiæ, & polline pellucidi egrediente veluti globulis glandulosis adspersæ. Crescit in sylvaticis montosis; in rupibus; & alibi. Floret Julio & Augusto.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA OCTAVA.

LINUM AUSTRIACUM. *Linn. syst. pag.* 224 *Scop. carn.* 1. *p.* 231.

Li-

Linum sylvestre caeruleum angustifolium. *Clus. hist. p.* 318.

Ex radice perenni, lignosa, calamum crassa, sordide pallente, aliquot uncias longa, & breviter multiceipite, caules annuatim prodeunt herbacei, a dimidio ad sesquipedem longi, teretes, simplices, superne tantum breviter ramosuli, modo procumbentes maximam partem, modo magis erecti. Folia sunt sparsa, subsessilia, sublanceolato-linearia, integerrima, acuta, erecta magis minusve. Pedunculi uniflori, filiformes, axillares, solitarii, in fructu penduli. Calycis foliola obovata. Petala ampla, striata, cum quadam purpura caerulei vel violacea, ungue flavo. Filamenta & styli caerulescunt. Antherae pallent. Stigmata cum virore flavescunt. Fructus congenerum. Semina fusca. Tota planta glabra est. Folia latitudine variant; ut depicta sunt ex latioribus. Crescit passim ad vias regias, in collibus herbidis incultis, & alibi. Floret Majo & Junio. Semina perficit Julio.

TABULA QUADRINGENT. DECIMA NONA.

THALICTRUM MINUS. *Linn. syst. p.* 377. *Scop. carn.* 1. *p.* 390. *Crantz. fasc. p.* 107. *Bauh. pin.* 335. (non *Fl. dan. t.* 244.)

Thalictrum foliis pinnatis, imis obtuse trilobis, supremis acutis; paniculis diffusis; floribus nutantibus. *Hall. hist. num.* 1139.

Thalictrum alpinum minus saxatile, rutae folio, staminibus luteis. *Seg. ver.* 1. *p.* 476. *t.* 11.

Ex radice perenni, horizontali, fibris deorsum tendentibus inbara pluribus, foris fusca, intus crocea, figuris paucis atque nigrati, caulis annuatim prodeunt novus, plerumque unicus, alius forte longitudinali pull alarum, ab unico ad tres circa dimidio pede altus, supra radicem apicillus & dentatae vaginantibus aliquot membranaceis instructus, superne in pedunculos ramosos diffusosque paniculatus, magis minusve flexuosus, solidus, obsolete striatus, fistulosus, hic illic purpurascens, nitidusque. Costae foliorum ad originem in patentes auriculas membranaceas producuntur. Folia sunt multiplicato-pinnata; foliolis brevissime petiolatis vel sessilibus, venosis, ad apicem bis terve incisis aut integerrimis, obtusis vel acutis, supra virentibus, subtus pallidis; caulis saepe glaucis. Floribus pendulis petala sunt quatuor, purpurascentia vel magis flava. Filamenta circiter viginti. Antherae cum virore aliquo flavent. Pistilla ut plurimum tria vel quatuor in totidem abeunt semina fulca, ovata, sulcata & acuta. Rami in paniculae divisionibus plerumque ex iisdem axillis foliorum. Crescit in saxis montosis apricis. Floret Junio & initio Julii. Semina maturescunt Augusto. Tabula exhibet plantam minorem, ut integra tibi pateret. Duas partem folii ex individua majore.

TABULA QUADRINGENTESIMA VIGESIMA.

THALICTRUM MAJUS. *Crantz. fasc. Ill.* 108

Crescit iisdem in saxosis locis cum priori Thalictro minori, nunc etiam in pratis; vere distinctum ab eodem, ad Thalictrum sibiricum accedens. Floret fere integro mense praecocius quam Thalictrum minus, adeo ut ante jam perdiderit hoc majus flores omnes, quam minus explicare primos incipiat. Radix longa, obliqua, fibrisque longis & teretibus alba, extus fusca, intus flavescens, perennat, & caulem unum alterumve quotannis producit. Hic flexuose ad duorum triumve pedum altitudinem erigitur, foliosus, paniculatus, teres, striatus, virescens cum suffusa purpura, ramis diversae longitudinis excuntibus fere

C semper

femper pluribus ex iisdem axillis. Folia inferiora componuntur ex petiolis communibus utrumque ter cum impari, his ipsis bipinnatis vel pinnatis; decrefcente numero divifionis verfus fuperiora. Foliola funt parva, ovata vel magis fubrotunda, pleraque fuperne trifida aut bifida, obtufa, breviter petiolata, vel feffilia, facie ex glauco virentia, dorfo quam maxime glauca. Petioli ad bafin membranacei, ad divifuras membranula carent. Flores funt penduli & odorati. Petala quatuor, oblonga, obtufa, concava, e viridi purpurafcentia cum ftriis elevatis. Filamenta pallida, a quindecim ad viginti. Antherae flavae & oblongae. Piftilla a quatuor ad feptem numerantur in totidem femina lanceolata, fulcata, acuta & fulca. Duo momenta obfervo conftantiffima, quibus a Thalictro minori diftinguo. Fere femper ex eodem caule & ramorum principum nodo bini vel terni egrediuntur rami; qui in minore fere femper folitarii funt. Ut foliorum prona facies in majori magis faturate vel iti ex una viret, poftica autem intenfe & ex albo glaucefcit; dum illa in minore viret laetius, haec vero pallet quidem, vix tamen, ut glauca dici mereatur. Quibus addi poffet longe major majori carnofitas; quam maxime autem tempus florendi conftantiffime diverfum, etiam quando juxta invicem coluntur in horto. Majus enim calorem perpetuo, ferius ad unum tertiam partem, altitudine fuperat minus, in ficcis quandoque a minore attingitur. Caeterum ftriae, radicula, fulci in caulis, craffities nodulorum, & alia variant ita in utroque, ut nihil certi determinent.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA PRIMA.

THALICTRUM NIGRICANS *Scop. carn. 1. pag. 391.*

Thalictrum flavum. *Crantz. fafc. pag.* 106.

Thalictrum foliis erectis, lobulis acute trilobis, fpica adfcendente. *Hall. hift. helv. num.* 1158. *β.*

Aeque dubius, quam clariffimus Scopoli, propono hanc plantam ceu diftinctam a Thalictro flavo fpeciem. Ab anguftifolio differt certe, quod haec floreat nigricante praecocius; folia habeat omnino omnia, etiam radicalia & caulina infima, aeque anguftiffima, circumfcriptione etiam ampliora, foliolisque multo numerofioribus; cum flores pallidiores. Nigricans ex radice ex fufco flavefcente, perenni, longeque fibris donata, emittit caules promit tres quatuorve pedes altos, erectos, ftriatos, fiftulofos. Petiolorum bafes dilatantur in membranas. Foliola funt lanceolata, acuta, facie faturate virentia, fubtus pallidiora venisque emicantibus exfculpta, utrinque glabra nec afpera; alia integerrima, alia ter vel bis incifa, idque imprimis in foliis inferioribus, ubi etiam latiora funt quam in fuperioribus. Panicula denfa, terminalis, erecta. Flores luteoli, odori, non cernui. Petala quatuor, parva, minus colorata. Stamina a fedecim ad triginta. Piftilla a duobus ad quinque ut plurimum. Semina totidem, fufca, fubovata. Crefcit in pratenfibus fylvarum udis.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA SECUNDA.

GALIUM SCABRUM

Ad nullam Linnaeanam fpeciem referre potui. Radix perennis, teres, ramofa, & cum rubedine aliqua fufcefcens, plurimos tenuiffimos ad telluris fuperficiem cauliculos fpargit perennantes, ex quibus annuatim plures caules herbacei prodeunt, erecti, ipfis hifce cauliculis multoties craffiores; fubteretes, ita ut ad lentem aliqua fui parte fint magis plani, alium obfoletiffime angulati; inferne brevibus albidisque villis denfe tecti & afperi; fuperne

ne glabri nitidique, & per ramos paniculati. Folia septena vel octona, in ramis pauciora, linearia, utrinque sulcata, mucronata, patentissima, eadem villis obsita & aspera, superiora autem minus. Pedunculi plus minusve ramosi. Flores valde odorati. Corolla alba, patentissima, quadrifida, rarius trifida, laciniis lanceolatis & acutis. Antheræ flavæ. Fructus parvi & glabri. Crescit in silvaticis. Flores Junio.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA TERTIA.

ALLIUM ANGULOSUM. *Linn. syst. p. 239.*

Allium senescens. *Jacq. obs. bot. 2. p. 57.*

Allium radice senescente ligulis transversis; foliis radicalibus gramineis; floribus umbellatis. *Hall. hist. helv. num. 1227.*

Allium sive Moly tertium foliis primum & alterum. *Clus. hist. p. 195.*

Ob incertitudinem reliqua synonyma omitto, quæ universa apud Hallerum loco citato videri possunt, ubi etiam Allium Linnæi senescens cum hoc angulosa seu variens conjungunt, dum tamen Gmelini adducta a Linnæo figura Allii senescentis foliis multum differat, ut verum quam maxime hæc planta variis in regionibus debeat. Apud nos haud ita ludere sueviт. Tota glabra est odorisque alliacei. Bulbus ex ovato oblongus & altius ætate versus basin lignosam indolem acquirit, diversamque induit formam, cui tunc plures bulbi junctim innascuntur. Folia radicalia sunt linearia, plura, angusta, erecta, pedalia vel breviora, obtusa, ad dorsum protuberans argute angulata, facie canaliculata vel plana. Scapus striatus & anceps vel quandoque magis tetragonus erigitur foliis altior. Spatha membranacea, albida, bivalvis, nec caudata, pedunculis duplo brevior est. Hi frondi umbellam formant hemisphæricam densamque. Flores suave olent. Petala ovata, acuta, patentissima, & mole æqualia omnia, modo alterna tria sunt angustiora, pallide purpurascentia. Filamenta corollam æquant, subulata omnia. Antheræ virent, dein nigrescunt. Germen in thalamo albet.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA QUARTA.

ACONITUM CAMMARUM. *Linn. syst. edit. 13. pag. 419.*

Aconitum caule ramoso, paniculato; petalis mutelliformibus; calcaribus unguiculatis longiori. *Hall. hist. helv. num. 1198.*

Aconitum Lycoctonum novum Judenburgense. *Clus. hist. p. XCVII.*

Aconitum cæruleo purpureo flore maximo, sive Napellus quartus. *Bauh. pin. 183.*

Ab Aconito Napello diversissima planta, ut a perito vel eminus distinguatur, in quibusdam subalpinis pratis ad sylvarum margines non minus frequenter occurrit, quam Napellus in aliis. Habitus cum Napello idem; eadem structura floris; pistilla & capsulæ simili numero varietate ludunt; nec alias diversa radix, nisi quod ex caulis geniculo inferiore bulbillum quandoque enatum viderim, uti icon habet Clusiana. Differentias itaque sola adferam. Folia in superiore pagina nec nitent, nec atrovirent, in lacinias divisa latiores. Racemus caulem terminans brevior est, semper magis minusve foliosus, & rarior. Pedunculi longiores magisque patuli. Flores minus profunde cærulei, (qui in Napello fere sunt atroviolacei,) hic dilutius cyanei, pallide cærulei, quin imo interdum pene excolores. Petalum galeatum multo longius, villis plane destitutum, inque rostrum acutum notabilius protrahitur. Floret Augusto.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA QUINTA.

ASTER AMELLUS. *Linn. syst. p. 554. Scop. carn. 2. p. 170.*
Aster caule folioso; foliis serratis, ciliatis, lanceolatis, obtusis; calycis squamis ovatis, ciliatis. *Hall. hist. helv. num. 83.*
Aster villosus, Italorum & Fuchsii. *Clus. hist. p. XV.*
Aster asperus. *Dod. pempt. 2. t. 3. c. 24.*
Aster asperus sive virgineus. *Blackw. t. 109.*
Aster asperus cæruleus vulgaris. *Bauh. pin. 267.*

Ad margines sylvarum, ad vineas, aliisque in locis creber; floremis Augusto & Septembri. Radix perennis, fusca, multiceps, fibrosque numerosis fibrata; caules digiti crassitudine plures, erectos vel basi adscendentes, a dimidio pedis ad duos pedes altos, scabros villosos, teretes, subsulcatos, plerumque supra medium, multa etiam circa radicem ramosos. Folia numerosa alterna, lanceolata-oblonga, scabra, ad oras villosula, integra, obtusiuscula, caulina infima & radicalia petiolata, reliqua sessilia. Calyces virentes squamæ sunt oblongæ, obtusæ, ad oras villosulæ; interiores erectæ & ad apicem purpureæ. Corollulæ radii ejus levi purpura cæruleascunt. Discus est luteus. Seminum pappus est pilosus & sessilis.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA SEXTA.

DAPHNE CNEORUM. *Linn. syst. p. 272.*
Thymelæa Cneorum. *Scop. carn. t. p. 278.*
Thymelæa foliis glabris, lineoribus, oblongis; floribus sessilibus umbellatis. *Hall. hist. helv. num. 1027.*
Thymelæa minor, vel Daphnoides alpinum. *Gesn. sylv. num. 6. pag. 5. tab. 3.*
Thymelæa alpina linifolia humilior, flore purpureo odoratissimo. *Tourn. inst. p. 594. Duham. arbr. 2. p. 326. tab. 94.*
Thymelæa affinis facie externa. *Bauh. pin. 403.*
Cneorum Matthioli. *Clus. hist. pag. 89.*

Frutículus ærii cotus, glaber, dumque floret, speciosus, ex radice longa, lenta, teretis, calamum, digitumve crassa, simplice vel ramosa, intus albicante, & fœtu aut flavescente, aut magis fusca, caules generat plures lignosos, perennantes, breves, fuscos, teretes, debiles, adscendentes, graciles, & ipsis interdum radices agentes. Rami juniores virent, foliosi, & in summitate umbellam florum sessilium conferam gerentes. Folia sunt ex oblongo lanceolata, sparsa, integerrima, frutula, virentia, & brevissima visque conspicuo mucrone prædita. Flores sunt imbri & suaveolentes. Tubus externe est villosus, & cylindricus tenus cum limbo patentissimo, ut sit corolla hypocrateriformis. Laciniæ sunt obtusæ vel acutæ. Filamenta altiora subjiciuntur ipsi fauci. Antheræ sunt lutææ. Germen hirsutum transit in baccam albidam & monospermam. Crescit in montosis, floremis Aprili & Maio.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA SEPTIMA.

CHONDRILLA JUNCEA. *Linn. syst. edit. 13. pag. 594. Hall. hist. helv. tom. 17.*
Chondrilla juncea, viminea, arvensis. *Tabern. ic. 178.*
Chondrilla juncea viscosa arvensis. *Bauh. pin. 130.*

Chondrilla.

Chondrilla viminalibus virgis. *Cluf. hift. pag. CXLIII.*
Chondrilla viminea. *Bauh. hift. 2. p. 1021.*

Radix perennis, eliamum & ultra craffa, albida vel nigra, longa, fibrisque emiffis prædita, caulem promit unicum vel plures, erectos, teretes, herbaceos, glaucos, bi- vel tripedales, in ramos numerofos virgatosque folutos, medulla nivea farctos; lacte, uti tota planta, vifcido fcatentes; in infima fui parte pilis rigidis, nec tamen pungentibus, denfiffime hirtos; cæterum glaberrimos. Folia radicalia plura, in orbem fparfa, longe petiolata, tenera, fuperne latefcentia, runcinata, acuta; caulina fubfequa fimilia; fenfim altiora magis integra; tandem integerrima, acuminata, longe lanceolata, fumma linearia & feffilia. Radicalia autem illa, & caulina inferiora, in adulto caule, marcefcere & perire folent, ut tunc caulis inferne fæpe longe aphyllus fit. In foliorum infimorum nervo dorfali quandoque etiam pili rigentes adfunt. Pedunculi flores fuftinent breviffimi; vel nulli. Calyx cylindricus, ftriatus, viridis, fit ex foliolis acutis, fublinearibus, pluribus, uno ordine pofitis; auctus ad bafin foliolis paucis breviffimis; poft corollæ lapfum ventre turgidulus; in fructu maturo patentiffimus. Corollulæ plures, ligulatæ, ftriatæ, quinquedentatæ, flavæ. Antheræ luteolæ. Stigmata flavent. Semina linearia, ftriata, & afpera, inftruuntur calyculo proprio pentaphyllo, tum pappo ftipitato & pilofo. Floret a Julio ad Septembrim. Semina maturefcunt Augufto & menfibus fubfequis. Crefcit in collibus apricis, in arvis, ad vias.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA OCTAVA.

DICTAMNUS ALBUS. *Linn. fyft. pag. 292. Scop. carn. 1. p. 284. Bauh. pin. 222. Blackw. tab. 35. Mill. ic. 123.*
Fraxinella. *Hall. hift. helv. num. 1029. Cluf. hift. p. 100.*

Speciofa planta in montofis fruticofis crefcit, florens Majo, femina perficiens Augufto, & tota quanta odore prædita aromatico, forti, gravi, nec ingrato. Radix perennis, lignofa, torulofa, pollicem & ultra craffa, cortice veftitur craffo, fæpe fiffo, albicante, & ipfo fubligno, vix odorato, illi qui fapore pollet aromatico, acri, parumper amaricante, & ingrato. Caulis unus alterve, erectus, teres, annuus, bipedalis, fimplex, racemo florigero terminatur. Folia funt pinnata, alterna, petiolata, ex foliolis utrinque circiter quinis, ovatis, fubfeffilibus, leviffime ferratis, obtufis, firmulis, in vegeta ætate vifcidis; cum terminante impari; quandoque abrupte pinnata; cofta antice fulcata. Caulis fuperior & foliolorum pagina adverfa ad microfcopium villofa funt. Perianthii pentaphylli & decidui foliola funt vifcida, hirfuta, ex rubro virentia, parva, lanceolata, & acuta. Petala quinque, rubella, lanceolata, utrinque acuta, plana, magna, patentiffima, duo furfum flexa, duo lateraliter, & infimum deorfum propendens. Filamenta decem, declinata, inæqualia, rubella, inferne hirfuta, fuperne glandulis feffilibus fubrotundis aut pyriformibus rubrisque cum vertice fufco adfperfa. Antheræ virefcunt. Germen ovatum, hirfutum, breviter & craffe pedicellatum, pentagonum, atrovirens. Stylus filiformis, glaber, fitu flaminum. Stigma fimplex. Capfulæ quinque, afperæ, pallide fufcæ, oblongæ cum apice truncato & utrinque breviffime acuminato, compreffæ, uniloculares, interiorum & apice dehifcentes. In qualibet capfula arillus eft bivalvis, elaftice diffiliens. Semen unum alterumve, atrum, nitidum. In tabula feorfim exhibentur fructus integer dehifcens, uterque arillus, femen; & auctum ftamen.

TABULA QUADRINGENT. VIGESIMA NONA.

HIERACIUM CHONDRILLOIDES. *Linn. fyft. pag. 123. Jacq. vind. p. 273. t. 7.*

Hieracium alpinum pumilum, chondrillæ folio. Bauh. pin. 64.

Ex radice nigra, calamum crassa, incurvata, præmorsa, perenni, fibrisque longis crassisque nuda, caulis recta ascoliturve semipedalis, vel paulo longior, plerumque nudus, superne in paucos pedunculos ramosus. Folia radicalia plura, longe petiolata, anguste lanceolata, acuta vel obtusiora, integerrima, vel dentibus eo instar magis, quo sunt caulí propiora & caulina dicenda magis. Caulina sunt alterna, longa; varie & profundissime pinnatifida, ut vix duo specimina similima reperire liceat; extremitate longe lanceolato-linearí & acuminata; laciniis linearibus acutis & dissantibus; inferiora petiolata; summa sæpe sessilia. Ligulæ ad pedunculos angustæ & integerrimæ. Calycis aroviventis foliola brevissime hispidula sunt. Corollæ, antheræ, & stylí flavent. Pappus sessilis, pilosus, & ad latitem denticulatos est. Caulis, pedunculi, & folia pauca superiora, microscopio spectata, villos monstrant. Folia reliqua glaberrima sunt. Crescit in saxosis alpinis; florens sub finem Julii & Augusto.

TABULA QUADRINGENTESIMA TRIGESIMA.

MENTHA AUSTRIACA.

Hæc nova, uti arbitror, Menthæ species crescit in insulis Danubialibus & aliis in locis udis, Menthæ arvensi maxime similis, ut pro eadem primo intuitu haberi posset, constantiæ diversissima statura minore, odore, brevitate staminum, majore hirsutie, altisque moniculis. Ex radice repente & perenni caules gignit annuos, semipedales & ultra, tetragonos, erectos, fere simplices. Ramuli, & folia utrinque, & calyces, brevissimo villo obducuntur. Folia sunt breviter petiolata, inferna ovata, reliqua lanceolata, acuta, serrulata, nervo medio foliorum piloso. Florum parvorum verticilli densi. Calycis denticuli æquales. Corollæ pallide violaceæ labium superius emarginatum vel semibifidum, & duplo latius laciniis tribus labii inferioris. Faux pilis albis claudituv. Filamenta brevissima simul cum antheris abscondita in inferiore parte tubi corollæ, ut plane nulla appareant. Floret Julio & Augusto.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA PRIMA.

HIPPOCREPIS COMOSA. *Linn. syst. pag.* 492. *Scop. carn.* 2. *p.* 74. *Crantz fasc.* 429.

Ferrum equinum siliquis umbellatis, undulatis. *Hall. hist. helv. num.* 391.

Ferrum equinum comosum. *Rai. syn. stirp. pag.* 93.

Ferrum equinum comosum seu capitatum. *Hall. append.* 1. *p.* 302. *t.* 301.

Ferrum equinum germanicum, siliquis in summitate. *Bauh. pin.* 346.

Planta tota glabra est. Radix lignosa, ramosa & perennis, annuatim plures in ambitum caulículos spargit herbaceos, ramosulos, procumbentes, striatos, & semipedales. Stipulæ ad folia ovatæ, acuminatæ, concavæ & patentissimæ. Folia petiolata, pinnata; foliolis oblongis, obtusis cum exiguo mucrone, integerrimis, brevissime petiolatis. Pedunculi teretes, striati, elongati, in summitate adscendentes, apicem flores gerunt in coronulam umbellatos. Calyx viridis, ad dimidium fere profunde divisus, atro purpureo striatus; denticulis acuminatis. Corolla flava. Alæ obtecte ovatæ, obtusissimæ. Carina in acuminatum rostrum desinit. Legumen angustum, acutum, glabrum, hinc illinc undulatum, ad semina torosum, inter illa planum. Semina oblonga, incurva. Reliqua sunt ad obtura-

dorem

Oetem Linnæi. Crescit in pratis alpinis. Floret Majo & Junio. Semina maturescunt Julio & Augusto.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA SECUNDA.

DRABA HIRTA. *Linn. fyst. pag. 432. an flor. dan. t. 242.?*
Draba stellata. *Jacq. vindob. pag. 256. tab 4. f. 3.*
Draba austriaca. *Crantz fasc. pag. 12. t. 1. f. 4.*
Draba caulibus subnudis; foliis tomentosis, ovatis. *Hall. hist. helv. num. 497.*
Draba foliis lanceolatis, integris; caulibus subfoliosis; siliculis oblongis. *Ger. prov. pag. 345.*
Bursa pastoris alpina hirsuta. *Bauh. pin. 108. prodr. 51.*
Bursa pastoris alpina minor hirsuta, foliis serratis integris, ad geniculà vero crenatis, loculo oblongo. *Moris. hist. 2. p. 306. s. 3. t 20. f. 8.*
Bursa pastoris minima ex monte Splugel. *Bauh hist. 2. p 958.*

Floræ Danicæ icon minus repræsentat nostrarum planarum, caulibus imprimis in sua nudis, foliisque omnino omnibus integerrimis, quæ in nostrarum ægre quadrant, ut denuo proponendam hanc censeam, quo certius facti aliquid ab utraquisque autoritas possit. Radix fusiformis, tenuis, valde longa, perennis, & multiceps, fixorum filiuris innascitur in summis alpium jugis, densasque non raro caulium cespites generat. Hi a foliis præteritis emarcidis vestiti, terminantur in rosulas foliorum densas, e quarum centro cauliculi exeunt. Folia sunt lanceolata, basi attenuata, ciliata & adspersa utrinque pilis albidis & apice stellatis, facie tamen glabriora, obtusiuscula vel acuta, crassula, subincana, integerrima (idque rarissime omnia) vel utrinque uni- vel bidentata. Caulis, unaquam a me viso plane aphyllo, simile foliorum unicum insidet, raro bina, ut glutinum denticulo aliquo notatum, scilicet, quandoque eum demissum, ut inter rosulæ folia abscondatur. Caulis ab una ad quatuor uncias altus exit in racemum floribus a duobus ad decem onustum. Calyx cum virore flavet, oblongissimus concavus & erectus. Petala sunt nivea, integra, plana, obverse ovata, cum unguibus erectis, brevibusque, ampla, saepenumero patentissima & calyce duplo longiora. Filamenta albente, calycem parum superantia. Stylus brevis persistit. Siliecula est ovalis, compressa, glabra, recta, aut parum incurva, semina plura continens flavescentia. Vidi etiam specimen majus ex alis ramolum, quatuor hinc folia in caule gerens, eaque integerrima. Floret Majo & Junio. Semina perficit Julio. In tabula exhibetur planta major cum fructu maturo, ■ minor florem.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA TERTIA.

TRIFOLIUM ALPESTRE. *Linn. fyst. pag. 502. Jacq. obs. part. 2. pag. 14. tab. 64. Crantz fasc. pag. 407.*
Trifolium foliis ovatis, nervosis; suprernis conjugatis, vaginis lanceolatis. *Hall. hist. helv. num. 376.*
Trifolium majus secundum. *Clus. hist. CCXLV.*
Trifolium spica longiore, flore purpureo. *Rav. syn. retr. tab. 12.*
Trifolium montanum purpureum majus. *Bauh. pin. 328.*
Trifolium majus Clusii secundum, non album, sed rubrum. *Bauh. hist. 2. p. 375.*

Ex radice perenni, tenui, remota, longa & infra telluretn repente, plures enascuntur caules, semper erecti, dimidium vel & totum & ultra pedem alti, teretes, plerumque

que ſimpliciſſimi ſine ramo ullo, qui ſi ex alis foliorum inferiorum adeſt aliquis, vix florem producit; villis oculo nudo ægre conſpicuis veſtiti, & hinc ☞ ceſtum parumper rudes, firmuli, nec flexuoſi. Stipulæ anguſte lanceolatæ, acutæ, villoſæ & ciliatæ, erectæ, virides, infra petiolum ſtriatæ cum ſtriis quamplurimis. Petioli villoſi. Foliola longe lanceolata, ſubſeſſilia, acuta vel obtuſiuſcula, ☞ oras ſemiſſimæ ferrulatæ, facie glabra, dorſo manifeſtius villoſa. Summi foliī ſtipula latior eſt; cui capitulum incumbit terminale, ſeſſile, ſubrotundum, ex iluſcidis inodoris & ex rubro lacteate purpureis denſe compactum. Atque hoc modo ſolitarium eſt, modo, idque multo frequentius, duplex, quorum tunc alterum ad totam fere floreſcentiam gemmæ alteræ eſt, quod e primario deprimitur, brevilſimoque pedunculo proprio ſeſſile, in proprio etiam foliī, ſæpe imperfecto, ſeſſile. Pericarpium albidi & omnino villoſiſſimi dens intimus longiſſimus & ferocem eſt, quatuor reliqui breviſſimi. Corollæ monopetalæ cariæ colorique eſt alis vexillaque pulchrioribus. Legumen fere compreſſum ☞ monoſpermum in calyce occultatur. Crebri paſſim ☞ margines ſylvarum, in fruticoſis, pratis montanis, & alibi. Floret Junio.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA QUARTA.

SIDERITIS MONTANA *Linn. ſyſt. pag.* 391 *Cruſ. faſc. pag.* 248.

Sideritis montana, parvo flore nigropurpureo, capite medio crocco. *Cat. exhib.* 1. *p.* 198. 2. 196.

Sideritis montana, parvo varioque flore. *Bauh. pin.* 233.

Annua planta in agris, arvis, glareoſis & aſperis locis, haud infrequens, ex radice pallida & tenere caulem profert ſupra ipſum mox terram plus minuſve depreſſum, hinc erectum, ſemipedalem, etiam ſeſquipedalem, ſæpe ramoſum, obtuſe tetragonum, totum foliolum, & una cum foliis calycibuſque hiſpidum. Folia ſunt oppoſita, lanceolata, baſi inferiora longe anguſtata in petiolum, acuta, ſupra medium rariter ſerrata, ſummia integerrima, nervoſa. Flores verticillati, ſeſſiles; occupamus totum fere caulem, ramoſque, tandem adnodum elongatos; terni in qualibet axilla foliī. Perianthii rigiduli & virentis tubus eſt turbinatus. Limbi bilabiati, nervoſi, & patuli, laciniæ quinque, lanceolatæ, valde mucronatæ, ferme æquales, ut duæ inferiores ſint dimidio paulo anguſtiores. Corolla calyce minor tubum habet longitudine tubi calycis, ilaveſcentem. Faux paulo amplior, externe villoſa. Limbi laciniæ ſuperior ferrugineæ, brevis, lata, obtuſiſſima, erecta, integerrima, vel leviter emarginata cum denticulo angulo. Labii inferioris, in diſco flavi, & antrorſum porrecti, laciniæ ſubrotundæ, etiam ferrugineæ; intermedia latiore. Antheræ fuſcæ. Floret totam æſtatem. Additur pericarpium auctum.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA QUINTA.

EUPHORBIA CYPARISSIAS. *Linn. ſyſt. pag.* 334.

Tithymalus Cypariſſias. *Scop. carn.* 1. *p.* 339. *Cam. epit.* 964. *Bauh. pin.* 291.

Tithymalus foliis lineatibus, ſtipulis numeroſis, floralibus cordiformibus, petalis lanatis. *Hall. hiſt. helv. num.* 1047.

Radix perennis, calamum, vel digitum minimum craſſa, foris fuſca, inæqualis, longiſque fibris horizontalibus aucta, plures ſimuatim caules emittit herbaceos, erectos, dimidium vel integrum pedem altos, teretes, ramos ſoliioſos, in fructeſcentia autem foliis deciduis nudatos, pallide virentes, inferne ſimpliciſſimos, ſuperne ramis ſterilibus paucisque ornatos. Folia ſunt ſparſa, ſubſeſſilia, linearia, obtuſiuſcula, integerrima, glauca, numeroſa,

rosa, plerumque adscendentia, plana cum nervo medio subtus protuberante. Folia ramorum sunt duplo angustiora, sæpe lutescentia. Umbella terminalis, erecta, ex radiis a decem ad viginti. Atque hi sunt bis bifidi, ita ut plerumque singuli sustineant septem flores, per geminatam scilicet dichotomiam, quæ in ipsa sua divisione flosculum simul gerit solitarium. Tota umbella flavet. Flores sunt odorati. Involucri ad umbellam universalem foliola sunt plura, caulinis æmula. Involucella vero cordata, integra, acutiuscula, in planta fructescente magis minusve in rubedinem tendentia. Flos medius in divisione radii principe infima est hermaphroditus, sed nescio ob quem defectum sterilis & abortans. Reliqui sunt feminei & fertiles; ut adsit hic polygamia necessaria. Femineus est calyx campanulatus, intus hirsutulus, & quadridentatus; denticulis erectis, ad germen adpressis, ad apicem bifidis; illo, qui inter petala distantia stat, plane fisso. Petala quatuor, acute lunata, patentissima. Stamina nulla. Germen ovatum, erectum, extra calycem elevatum proprio pedicello. Styli bifidi, obtusi. Hermaphroditus est calyx quinquedentatus; corolla pentapetala; stamina circiter octo, articulata, erecta; antheræ geminæ; germen ad latus extra calycem pendulum. Capsula triquetra, muricato-rugosa. Semina glabra, albida. Tota planta glabra est, & lacte abundat acri, vesicas in cute excitante. Crescit passim & copiose in pratis, collibus herbidis, & alibi. Floret a medio Aprili ad finem Maji. Semina perficit Junio. Julio mense involucra utraque decidunt, dein etiam radii totaque umbella; atque pergunt tunc adhucdum diu laete vegetare rami steriles. Obnoxia sunt folia hujus plantæ fungulis, qui partem eorum posticam obsident densissime, pulverem mutrientibus luteum. Tunc totus caulis aliam formam induit, rosula terminatus foliosa, & rarissime flores producit; cujusmodi ad latus tabulæ caulis additur. Vocata sic planta ab auctoribus fuit *Esula degener*. Conspectus ille pulvis ad lentem exhibet fungulos concavos, orbiculares, intus luteos cum ora albo. Talis aucti folii portio etiam exhibetur in tabula. Tandem auctus flos hermaphroditus & femineus.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA SEXTA.

EUPHORBIA GERARDIANA.

Tithymalus umbella multifida, bifida: involucellis triangulari-cordatis; foliis superioribus latioribus. *Ger. prov. pag.* 540.

Tithymalus amygdaloides, angustifolius. *Tabern. ic.* 591.

Tithymalo maritimo affinis, linariæ folio. *Bauh. pin.* 201.

Copiose & passim reperitur in arenosis siccioribus pratis, ad ripas Danubii. Tota glabra est, & lacte turget candido & acri. Radix calamum & ultra crassa, fusiformis, semipedalis, fibris crassioribus aucta, foris nigra, intus albida, tenax, & perennis, annuatim plures caules promit herbaceos, fere erectos, teretes, plus minus pedales, modo simplicissimos, modo ex alis plures vel pauciores pedunculos radiis similes emittentes, inferne purpureos & in adulta ætate cicatriculis a foliis deciduis tuberculatos, plerosque floriferos. Folia per totum caulem dense sparguntur sessilia, sublinearia, acuta, plana, integerrima, glaucescentia. Umbella multifida ex radiis decem vel pluribus connexa. Involucri polyphylli foliola foliis caulinis similia, sed paulo breviora & latiora. Involucella sunt subrotunda, acuta vel obtusa, sessilia, plana, cum suffusa flavedine virentia. Radii bis vel ter bifidi cum dichotomiis modo flore oneratis, modo destitutis. Flores omnes sunt sessiles, hermaphroditi, fertiles, & inodori. Calyx glaber. Petala quatuor, ex flavo subrufescentia, subrotunda, integerrima. Antheræ flavæ. Capsula glabra. Semina pallida. Floret Junio & Julio. Ad marginem tabulæ sistitur flos auctus.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA SEPTIMA.

PHYTEUMA ORBICULARE. *Linn. syst. pag.* 163.

Rapunculus orbicularis. *Scop. carn.* 1. *pag.* 150.

Rapunculus cornutus. *Scop. carn.* 1. *pag.* 151.

Rapunculus foliis imis longe cordatis, caulinis sessilibus, acutis, bracteis ovato-lanceolatis *Hall. hist. helv. num.* 681.

Rapunculus corniculatus *Kit. mem. inr. tab.* 109.

Rapunculus cæruleus hirsutus major. *Barr. rar. ic.* 526. & minor *ic.* 525.

Rapunculus sylvestris umbellatus. *Thal. herc. pag.* 94. *tab.* 8. *f.* 1. & 2.

Rapunculus umbellatus latifolius; & angustifolius. *Bauh. pin.* 92.

Rapunculus folio oblongo, spica orbiculari. *Bauh. pin.* 92. *Moris. hist.* 2. *p.* 469. *s.* 5. *t.* 5. *f.* 47.

Rapunculus montanus, varius corollulatus. *Cel. ecphr.* 1. *p.* 223. *t.* 224.

Ex radice perenni, fusiformi vel magis ac raro decursu cylindrica, sæpe longa, caulis ambitum plerumque solitarios excrescit, erectus, simplicissimus, foliosus, teres, subsulcatus, & spica florum unica terminatus. Crescit in Austria copiose; at illa planta, quæ ad ipsos primos a planitie pedes montium, locis plerumque sicciusculis & saxosis frequens reperitur, ita differt habitu ab alpina planta, ut dubius hæserim diu, pro diversisne, an pro eadem specie proponerem? Cultura eandem demonstravit. Barrelierus in figuris citatis utramque delineavit, in 526 alpinam, in 525 altera collinam. In alpinis sunt omnia succulentiora crassioraque, folia angustiora magisque inflexa, caulis striatior, foliola involucri majora & sæpe capitulum excedentia. Utramque etiam ego exhibeo; florentem collinam; fructescentem alpinam; sed in hac, quod facillime accidit, capitulum fructigerum in spicam oblongam productum est, cum alias soleat esse ant subrotundum aut ovatum. Majus tamen sic exhibere; triplo enim vel duplo brevior cum eadem non diminuta latitudine quilibet illi finget. Folia radicalia prima, & sæpe hæc pauca, sunt longissime & gracilescr petiolata, minora reliqui, & cordata; cæterum vero aut acuta, aut obtusa, quin imo nonnunquam cordato-subrotunda. Caulina infima etiam petiolata, sed minus in alpinis. Superiora lanceolata vel oblonga. Reliqua angustiora & acuta. Omnia glabra, & obtuse magis minusve serrata. Flores colligantur in capitulum terminale, semper subrotundum, suffultum bracteis aliquot lanceolato-acuminatis, ad basin concavis & parum pe ores ciliatis, sessilibusque. Perianthium insidet germini, pentaphyllum, persistens; foliolis concavis, longe lanceolato-acuminatis, erecto-patulis, longitudine germinis. Corolla monopetala & cærulea dividitur ferme ad basin usque in quinque laciniis lineares, acutas, longissimas, recurvato patentissimas, ad tentem inens pilis albidis hirsutissimas. Filamenta quinque capillaria & brevia sustinent antheras ochroleucas, lineares, erectas, extrorsum pendulas. Germen inferum, angulatum, viride, glabrum. Stylus crassus, versus verticem capituli incurvatus, longitudine corollæ, cæruleus cum apice fuscescente. Stigma trifidum. Capsula pentagona, tetiocularis, polysperma, foraminibus perforando. Semina rotunda, parva, fusca, subovata. Floret Junio. Semina fert Augusto. Folia radicalia cordata raro in planta florente adsunt, sed solent frequentius post peractam fructificationem autumno prodire.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA OCTAVA.

SAXIFRAGA AIZOON.

Saxifraga foliis radicalibus in orbem positis, serraturis cartilaginosis. *Linn. fl. lapp. p.* 140. *t.* 2. *f.* 2?

Sa-

Saxifraga foliorum ora cartilaginea, ſerrata; petiolo pauciflori; petalis punctatis. *Hall. hiſt. helv. num.* 978.

Saxifraga ſedi folio angulatiore ſerrato. *Tourn. inſt.* 252. *Seg. ver.* 1. *p.* 448. *t.* 9. *f.* 1.

Aizoon ſerratum. *Cord. hiſt. pag.* 92.

Cotyledon minor, foliis ſubrotundis ſerratis. *Bauh. pin.* 285. *prodr.* 133.

Cotyledon media, foliis oblongis ſerratis. *Bauh. pin.* 285.

Sedum ſerratum. *Bauh. hiſt.* 3. *p.* 689.

Radix multiceps & perennis roſulas foliorum plures denſaſque formas. Sunt illa conciformia ſive lingulata, firma, craſſa, glabra, obtuſa, ad baſeos angulatæ oras tamen lanuginoſa, virentia cum limbo albo ſerrulato ■ cartilagineo. Ex roſularum centro caulis oritur erectus, ■ ſæpe minutis ſpiculatibus, virens aut rubellus, teres, ſtriatus, pilis mollibus & apice od lentem fuſco-capitatis, foliis paucis ſparſis erectisque in adſcenſu veſtitus, radicalium forma, cæterum ſe ſibi bus, paulatim anguſtioribus minoribusque, ſummis acutis. Ex horum ſuperiorum omnium alis pedunculus exit etiam ſæpius, unam alteramve uncialem longus, ad extremitatem plerumque tribotrus; pedicellis propriis brevibus. Flos ipſum caulem terminat ſolitarius, reliquis paulo major & præcocior. Inveni in alpibus pumilum ſpecimen, in quo unicus ſine omni caule flos feſſilis centrum roſulæ ſubiectæ occupabat. Flores ſunt odorati. Calyx glaber nitidus & germini inferne accretus viret, petalis duplo brevior. Hæc ſunt oblonga, obtuſiſſima, patentiſſima, albida, dorſo tribus lineis ex flavo virentibus obſolete notata, modo punctis rubris aſperſa, modo inintuentia. Filamenta albens. Antheræ flavent. Corona germinis eſt margo orbicularis concavus & luteolus. Fructus congenerum. Creſcit paſſim & copioſe in montibus & alpibus. Floret Junio & Julio. Eſt omnino diſtincta planta a Saxifraga Cotyledone, in Floræ Danicæ tabula 241 depicta, quam utramque Linnæus haud bene conjunxit. Neque culturam in horto per annos octava in alterum tranſivit, ſed Cotyledon ſemper valde paniculata evaſit, Aizoon pauciflora permanſit. Depingitur ſpecimen ex majoribus, cum aliud ex pumilis.

TABULA QUADRINGENT. TRIGESIMA NONA.

SCABIOSA OCHROLEUCA. *Linn. ſyſt. p.* 114. *Jacq. obſ. part.* 2. *pag.* 20. *tab.* 73. & 74.

Scabioſa ſeptima. *Cluſ.* ■. *III.*

Scabioſa multifido folio, flore flavicente. *Bauh. pin.* 270. *Morit. hiſt.* 3. *p.* 48. *ſ.* 9. *t.* 13. *f.* 23.

Scabioſa ſulphurea, inciſis foliis. *Barr. ic.* 770.

A Scabioſa columbaria, quacum hanc eandem ſuſpicantur Hallerus, & quæ etiam apud nos copioſe creſcit, diverſiſſima eſt planta: cæterum valde variabilis ſtatura, foliis & glabrities. Radix perennis ex fuſco albicat, eandem digitum craſſa lignoſaque. Caulis aut unicus, aut plures, teres, ab uno ad tres pedes altus, ſubereſtus, modo nitidus glaberque ex integro, modo contra totus vel dorſumque interne villoſus, pallide virens & od roſtrorum extortum ſæpe purpurafcens, idque ſtatutiſſime in individuis glabris. Caulium diviſio primaria eſt dichotoma; reliqua per pedunculos elongatos perficitur. Folia radicalia ſunt ■ plantæ primi anni, æque ac caulina infima, ſpathulato-lanceolata, integra, inæqualiter ſerrata, quandoque uno alterove dente profundius inciſa, in petiolum longius attenuata. Hæc in annoſoribus magis magiſque inciduntur, ut pinnatifida, ſubpinnata, etiam ſubbipinnatifida evadant. Caulina ſumma ſunt ſimpliciſſima, proxima pinnata, infima ſæpe bipinnatifida: pinnulis linearibus acutiſque. Folia glabricie vel villoſitate eadem imitantur; quarum inſignes varietates in Obſervationum tabulis cinaris exhibui, ubi ſpecimen majus ſiſtitur. Quem

hic depingitur minus. Florum constans color est ochroleucus. Flosculi sunt inæquales, radiati & quinquefidi. Involucri foliola plura, linearia, acuta, & corollis breviora. Perianthium proprium interius quinque setas habet. Semen ovatum, obtusulcatum, basi villosum, margine membranaceo coronatum. Capitulum fructiferum est ovatum. Crescit in collibus gramineis siccis, in montanis saxosis apricis, & alibi. Floret a Julio ad Octobrim.

TABULA QUADRINGENTESIMA QUADRAGESIMA.

SERRATULA PYGMÆA.
Carduus pigmæus. *Jacq. vindob. pag.* 282. *tab.* 8.
Carduus mollior humilis angustifolius. *Clus. hist. CLI.*
Carduus mollis, folio oblongo, cirsii capitulo. *Bauh. pin.* 377.
Cnicus pygmæus. *Linn. syst. pag.* 531.
Cirsium pigmæum. *Scop. carn.* 2. *pag.* 123.

Post tot brevi tempore mutata nomina, licet iterum mutare, & ex propria peritissimorumque Botanicorum sententia associare Serratulis, quarum certe toto charactere gaudet, a Carduis Cnicisque Linnæi nimium aberrans. In Austriæ alpibus raram plantam unico in loco huc usque inveni, sed tam hic copiosam, ac si nata ex semine de industria sato fuisset. Paucissimas tamen florentes offendi. Radix perennis, nigra, longa vel brevior, simplex vel ramosa, fibris aucta descendentibus, interdum multiceps, & pauco sapore dulci ac subaustero prædita, a foliis delapsis caput squamis latis vestitum gerit. Caulis erectus, fistulosus, a duabus ad quinque uncias altus, superne incrassatus, pilis albis densissime tegitur. Folia radicalia & caulina plurima, sublinearia, acuta, triuncialia, alia integerrima, alia denticulata, inermia, lateribus revoluta, sessilia, per nervum medium extus protuberantem sulcata interno, pilosa ac subtus & versus caulem quam maxime, facie virentia saturate, dorso pallide. Flos solitarius, terminalis, erectus, subodoratus, ratione plantulæ maximus, sessilis in fontmis brevioribus foliis. Calyx communis ovatus vel magis oblongus, imbricatus; squamis plurimis lanceolatis, acuminatis, inermibus, pilosis, ciliaris, ad basin purpurascentibus, ceterum pallide virentibus, intimis erectis, interioribus apice patulis. Corollulæ omnes hermaphroditæ, purpureæ. Tubus gracilis & longus in amplum dein cylindrique formam expanditur, in lacinias quinque lineares obtusas æquales brevesque abeuntem; in exterioribus flosculis valde incurvatus, in centralibus rectos. Antheræ sunt violaceæ. Stigma bifidum purpurascit. Calyx immutatus in fructu. Receptaculum planum villis albis capillaribus & longitudine calycis obsidentur. Semina oblonga, obsolete angulata, glabra, fuscescentia, coronantur pappo sessili, plumoso, & longo. Floret Julio & Augusto. Ad latus tabulæ conspiciuntur, flos integer adhucdum clausus, flosculus ex ambitu, & folium plantæ culæ.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA PRIMA.

CREPIS AUSTRIACA. *Jacq. vindob. pag.* 270. *tab.* 5.
Hieracium austriacum. *Linn. syst. pag.* 523.

Radix lignosa, perennis, fusca, sæpe horizontalis, fibris crassis aucta, & quandoque præmorsa, caulem plerumque solitarium gignit, erectum, pedalem & ultra, inferne rubentem, superne striatum & hirsutum, foliosum, aut simplicissimum uniflorum, aut superne in paucos pedunculos ramosum. Folia radicalia pauca, in planta florente plerumque jam nulla, oblonga, denticulata, & ex petiolo longo orta. Caulina alterna; ex oblonga figura

in

in lanceolatam eo magis mutata, quo superiora sunt; acuta, denticulata, sessilia, & basibus acute productis subamplexicaulia, hirsutula. Flos magnus. Calycis atrovirentis & nigro-hispidi squamæ oblongæ, acutæ, duplicis seriei; exteriores laxi, patentes, & ab interioribus crectis distantes, Crepidis characterem perfecte indicant. Corolla flava. Semina oblonga coronantur pappo albo sessili & piloso. Crescit in subalpinis, & alpinis; florens Augusto. Planta depicta est in umbrosis nata.

TABULA QUADRING. QUADRAGES. SECUNDA.

RANUNCULUS THORA. *Linn. syst. p.* 378. *Jacq. obs. pag.* 25. *tab.* 13. *Vindob. pag.* 249 *Scop. carn.* 1. *pag.* 398. *Crantz. fasc. pag.* 119.
Ranunculus foliis duris, venosis, reniformibus, rotunde crenatis; convexitate retusa, acute serrata. *Hall. hist. helv. num.* 1178.
Thora major; & minor. *Camer. epit.* 825. & 826.
Thora Valdensium; & Ranunculus grumosa radice tertius. *Clus. hist. p.* 239. *Lob. ic.* 604.
Aconitum pardalianches primum; & alterum. *Bauh. pin.* 184.
Lineum pardalianches genus, uno tantum folio. *Dalech. hist.* 1738.

Tota planta nitida est. Radix teres, fuscescens, unam alteramve unciam longa, perpendicularis, calamum crassa, & persistens, in toto decursu crura multa deorsum emittit filiformia, longa, pallida, & subimbricata. Caulis teres, a palmo ad pedem longus, erectus, ad collum purpurascens, inferne aphyllus. Folia radicalia subreniformia, coriacea, firma, venosa, longe petiolata, lateribus crenata, superne non eodem modo incisa, etiam simul sæpe retusa; in planta florente plerumque solitaria, etiam nulla; semper paucissima. Tale folium, sed radicali multo amplius, brevius que petiolatum, quandoque sessile, summam caulis partem semper unicum occupat; e cujus axilla prodit ramulus uniflorus, dum ipse caulis in similem terminatur, aut in paucos alios eodem dispescitur, idque in plantis vegetioribus; ubi alias quoque sine ramo ullo in unicum florem ipse caulis abit. Ramulorum folia sunt lanceolata, acuta, integerrima & sessilia; in plantis magis ramosis infima trifida aut bifida in lobos foliis summis quoad figuram similes. Petala sunt quinque, nonnunquam sex, lutea cum ungue pallidiore, patentia. Calycis foliola ovata, acuta, petalis breviora, atque horum situ & numero. Semina pauca, glabra, fusca, hinc planula, inde subrotunda, prædita mucrone inermi reflexo. Crescit in saxosis alpium; majora specimina reperiuntur sub pinetis, cujusmodi est depictum fructescens. Floret Majo. Semina perficit Augusto.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA TERTIA.

CRATÆGUS TORMINALIS. *Linn. syst. p.* 342.
Sorbus torminalis. *Crantz. fasc. p.* 85. *Chm. epit* 162.
Sorbus torminalis & Cratægus Theophrasti. *Bauh. hist.* 1. *p.* 63.
Sorbus torminalis Plinii. *Clus. hist. p.* 9.
Mespilus foliis serratis, septilobis; lobis primis divergentibus. *Hall. hist. helv. num.* 1088.
Mespilus apii folio sylvestris, non spinosa, seu Sorbus torminalis. *Bauh. pin.* 454

Arbor comosa in sylvis crescit, florens ineunte Majo, fructus dans Septembri. Folia sunt alterna, petiolata, glabra, circumscriptione ex ovato subrotunda, serrulata, facie saturate, dorso dilute virentia, septemlobata; lobis acutis; infimo utrinque ad angulum acu-

tum excunte & lanceolato; reliquis brevibus, furſum tendentibus. Cymæ terminales & axillares in ramulis junioribus, valde irregulares, villoſulæ uti toti ramuli. Flores ingrate odorati. Germini ovato villoſo ■ ſubincano inſidet perianthium monophyllum, pallidum, baſi concavum, dein patentiſſimum & acute quinquedentatum, perſiſtens. Petala quinque, alba, ſubrotunda, ſeſſilia, obtuſa, concava, patentiſſima, calyci, quo multo majora, inſerta. Filamenta ſetæ vigini, alba, ſubulata, patentia, longitudine corollæ. Styli duo, infra medium connati & hinc ſulco utrinque exarati. Stigmata capitata. Fructus oblongus vel ſubovatus, obtuſus, calycis emarcidi reliquiis coronatus, leviter umbilicatus, maturitate fuſcus, carnoſus, auſterus, bilocularis; nucleis meſpili communis ablinitur molleſcens, edulis, & ſaporis aciduli gratique. Semina in quolibet loculamento bina, ſed quorum alterutrum plerumque abortat, glabra, ſubovata, cortice donata badio, nucleo candido.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA QUARTA.

ANTHEMIS AUSTRIACA.

Ex radice annua ramoſa & pallente unicus ut plurimum caulis enaſcitur, erectus, vix pedalis, teres, in ramos paniculatus. Folia ſunt bipinnata, brevia, craſſula, ſubſeſſilia; pinnulis mutuis, conniventibus, lanceolatis, mucronatis, integerrimis, ■■ leniter ciliatis, ſeſſilibus. Flores ſolitarii erecti & pedunculati ramulos terminant. Calycis hemiſphærici ſquamæ ſunt ad oras pilioſæ. Radii petala ſunt alba, tridentata denticulo intermedio minimo, patentiſſima, nodo reflexa. Diſcus luteus. Receptaculum conicum veſtitur paleis oblongis, mucronatis & ſemina longitudine ſuperantibus, nec pungentibus. Semina oblonga, angulata, pappo deſtituta. Caulis, rami, folia & calyces ſunt lanuginoſe villoſuli. Folia, imprimis vero flores, valido pollent odore Matricariæ officinalis, cui quidlam de Chamomilla junctum eſt; ſapore autem amaro. Creſcit paſſim inter ſegetes & ad vias; in arvis ceſtabilibus ita nonnunquam abundans, ut ſata videatur. Floret totam æſtatem. Si in hybernaculum transferatur, in olla creſcens, ſæpe perennat, totumque floret hyemem.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA QUINTA.

ARENARIA LINIFLORA? *Linn. ſyſt. edit. 13. pag. 355.*

Saxis ſummarum alpium frequens innaſcitur, hic ſemper pumila, denſe cæſpitoſa, & cum ■ dumoſarum tunſtoros provectus; in demiſſioribus earundem jugis paulo altior & ex ſupremi ſolii axilla ſerius alterum florem pedunculatum exſerens. Hic pedunculus ut plurimum in progreſſu ſolia duo oppoſita emittit. Uterusque acon in tabella pingitur. Radix perennis, cinerea, teres, longaque, rupium liſſuras penetrat, turculoſque numeroſos gignit ramoſos perennantes foliorumque rofulis terminatos. Hæc ſunt ſubulata, acuminata, lævia, craſſa, erecto, dorſo tereti, facie plana. Ramuli florentes ſunt annui, erecti, unicum vel tres uncias longi, teretes, foliis oppoſitis lævioribus latioribusque paucis veſtiti, ſuperne villoſuli, inferne glabri. Quandoque terni ramulus cum calyce foliisque purpuraſcit. Foliola perianthii ſunt lanceolata, acuta, patentiſſima, glaberrima, concava, bilineata, in fructu imprimis ſtriata. Petala alba, obverſe ovata, obtuſa, patentiſſima, calyce paulo longiora. Antheræ didymæ cum virore pallent. Capſula ovato-oblonga. Semina plurima, reniformia, muricata, fuſca. Floret Julio & Auguſto.

TA-

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA SEXTA.

CAREX PRAECOX. *Schreb. ſpec. lipſ. pag.* 63.
Cyperoides vernum. *Mich. gen. pag.* 64. *num.* 70. *Seg. ver.* 1. *pag.* 122. *num.* 9. *tab.* 1. *fig.* 3. per errorem ſculptoris pro *fig.* 2. ſculpta, monente ipſo auctore *ver.* 3. *pag.* 84.
Cyperoides minus, ſpicis denſioribus. *Tourn. inſt.* 530.

Ex radice perenni folia enaſcuntur plura, ſubbinearia, acuta, integerrima, ſubcanaliculata, baſi culmum amplectentia, patula. Culmus triquetrus, aphyllus, erectus, plus minus ſeſquipedalis. Spica maſcula unica, terminalis, oblonga, teres, erecta, femineis duplo longior. Spicæ ſemineæ infra maſculam duæ frequentius, alternatim ſubſeſſiles, etiam dumtaxat unica, erectæ; ſumma maſculæ proxima, inferior paruinper remota. Squamæ ferrugineæ, in maribus obtuſæ, in femineis magis in ſtrictum mucronatæ dorſoque viridiores. Antheræ ochroleucæ. Styli albi hirſutuli. Semina ovalia, triquetra, ad lentem breviter hiſpidula. Cæterum tota planta glabra eſt. Creſcit paſſim in herbidis; florens a fine Martii ad medium Aprilem.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA SEPTIMA.

SORBUS DOMESTICA. *Linn. ſyſt.* pag. 343. *Gmel. ſib.* pag. 87. n. 2. *f.* 3.
Sorbus legitima. *Cluſ. hiſt.* pag. 9.
Sorbus ſativa. *Bauh. pin.* 415. *Blakw. tab.* 174.
Malpilus foliis pinnatis, ſubtus villoſis. *Hall. hiſt. helv. num.* 1092.

Arbor valida, comoſa, trunco tandem bipedalis diametri, cortice rimoſo fuſcescente. Folia ſunt pinnata ex foliolis plus minus ſeptem cum impari, oppoſitis, ſeſſilibus, oblongis, acutis, argute ſerratis, facie glabris, junioribus dorſo lanuginoſe villoſis ac incanis, adultis etiam glabris. Coſta teres & junior lanuginoſa. Panicula florum odoratorum foliola & terminales. Pedunculi villoſi. Bracteæ ad pedunculos ſetaceæ & caducæ. Calycis labati & profunde quinquepartiti foliola patentiſſima, acuta, planiuſcula. Petala quinque, albida vel ſubochroleuca, ex ungue brevi ovato-ſubrotunda, valde concava, obtuſa, calyci inſerta, ſedecimque triplo longiora, parentaliſima & tandem reflexa. Filamenta circiter viginti, ſubulata, alba, corollæ longitudine. Antheræ ex fuſco flavæ, incumbentes. Germen inferum, turbinatum, lanuginoſum. Styli quinque, raro tres, filiformes, inferne lanuginoſi, ſuberecti, ſtaminibus paulo breviores. Stigmata capitata, obtuſa, viridia. Fructus pyriformes, noſtratibus Aeſchäpfe vocantur, glabri, calyce coronante tuberiſti, luſu ex rubro flavo viridique varii, intus cum quodam virore albidi, valde acerbo ſapore præditi, quinqueloculares, pentaſperme, quolibet loculo ex membrana bivalvi conſtructo. Semina ovata, compreſſa, cortice duriuſculo fuſco & glabro. Rara fructus triloculares eſt; ut ſæpius planta Pyri quam Sorbi ſpecies ſit. In quinqueloculoribus autem loculi etiam aliquot ſæpe oblitterati ſeminibusque vacui. Nonnunquam fructus duplo, quam depictus, major ℳ. Edulis evadit & grati ſaporis, quando ſtrumæ actus mulleſcit, undique tunc fuſcus. Flores ineunte Maio. Fructus matureſcit Octobri. Ad latus depingitur fructus transverſim deſectus, cum loculis membranaceis, & ſemen.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA OCTAVA.

SCIRPUS ROMANUS. *Linn. ſyſt.* pag. 83.

Scirpus capitulo singulari, radice tomentosa. *Barrel. ic.* 255. *fig.* 3.
Scirpoides acutum maritimum, capitulo glomerato folitario. *Scheuchz. gram.* 373. *tab.* 8. *fig.* 6.
Juncus minor acutus maritimus, prolifer ex uno capitello multa. *Pluk. alm.* 200. *t.* 40. *f.* 5.

Radix perennis, teres, horizontalis, calamum crassa, intus albicans, dura, plures successive denso & cespitoso agmine producit plantas, basi bulbiformes & arcte vicinis appressas, quæ multas emittunt radices fibrosas longas teretesque, alias crassas & tactu parumper spongiosas, alias graciles. Basin plantularum obvestiunt vaginæ variæ fuscæ, nitidæ, striatæ, acuminatæ, erectæ, ab una ad tres uncias longæ. Folia pauca, culmo semper breviora, cæterum longitudinis valde diversæ, semiteretia, antice sulcata cum oris retrorsum scabris, linearia, acuta, recta, radicalia omnia. Culmus erectus, teres cum parte aliqua obscure plana, ab unico ad tres pedes altus, viridis, medulla alba farctus. Flores colliguntur in capitulum subglobosum, sessile ad apicem culmi inter duo involucri foliola subulata & acuta, quorum alterum longissimum & sæpe erectum mentitur productum ultra flores culmum, latere suo sulcatum oritque asperis foliis nec culmo simile. Alterum gracilius breviusque, imo nonnunquam vix ipso capitulo longius, reflectitur. Et tale dum unicum capitulum est, convenit exactissime specifica Linnæi determinatio. Sed variat admodum planta, dum aut in omnibus ejusdem cespitis culmis capitulum sessile solitarium conspicitur; aut in alio cespite sessile illud plura alia pedunculata ubique comitantur; aut dum in eodem plantæ cespite alii culmi solitaria, alii plura capitula gerunt, manifesto indicio, optime Linnæum meras varietates pronunciasse. At vero quandoquidem non minor apud nos numerus est culmorum multicapitatorum quam illorum, qui unico capitulo gaudeant, definitio Linnæi stare nequit. Quin etiam scirpi Holoschœni determinatio mutanda sit, utpote scirpi romani varietatem multicapitatam exprimens non minus. Squamæ flosculorum sunt ovatæ, acutæ, concavæ, ex fusco viridi pallidoque variæ. Antheræ lineares, flavæ. Stigmata alba. Semina trigona. Crescit in pratis udis. Floret æstate.

TABULA QUADRING. QUADRAGESIMA NONA.

MOEHRINGIA MUSCOSA. *Linn syst.* p. 275. *Scop. carn.* 1. p. 277.
Alsine octostemon; foliis connatis, linearibus. *Hall. hist. helv. num.* 860.
Alsine muscosa quibusdam. *Bauh. hist.* 3. p. 365.
Alsine montana capillaceo folio. *Bauh. pin.* 251. *Scheuchz. it.* 7. *p.* 508. *t.* 6. *Pluk. alm.* 23. *t.* 75. *f.* 1.
Alsine saxatilis. *Lindern. hort. t.* 2.
Alsine tenuifolia muscosa. *Seg. ver.* 1. *p.* 418. *t.* 5. *f.* 1.
Alsine saxifraga angustifolia minima montana. *Till. cephr.* 1. *p.* 292. n 290.

Radix filiformis, ramosa, perennis, & infra terram repens, caules emittit herbaceos, filiformes, teretes, debiles, ramosissimos, annuos, & virentes. Folia sunt opposita, linearia, angustissima, integerrima, acuta, dorso teretia, facie canaliculata, sessilia basique parumper connata. Cauliculi terminantur ramose in pedunculos uniflores, unciales, successive florentes & elongandos; quibus subiiciuntur folia lanceolata & brevissima. Calycis foliola quatuor, lanceolata, acuta, patentissima, virentia cum oris pallentibus, persistentia. Petala totidem, oblonga, obtusa, plana, patentissima, alba, calycem superantia. Filamenta octo, alba, longitudine perianthii, capillaria. Antheræ ochroleucæ. Germen globosum ex flavo pallet. Styli duo, subulati, erecti, longitudine staminum. Stigmata simplicia acuta. Capsula globosa, unilocularis, quadrivalvis. Semina plurcula, reniformia, compres-

preſſula, nigra, cum filo excreſcente magno mulcibilo alboque. Creſcit paſſim in alpeſtribus ad ſeptentrionem, in locis udis, ſimilibusque. Floret totam æſtatem. Ad latus ſiſtitur caulinoli floriferi, jam adulti & evoluti pars ſuperior; tunc auctum multoties ſemen. Celeberrimum Segalierum non intelligo, qui aucores carpit, quatuor (nec quinque, uti ille obſervaſſe ſe ait,) flori hujus plantæ petala dantes, dum tamen quatuor dumtaxat ipſe in icone habet.

TABULA QUADRINGENTES. QUINQUAGESIMA.

EUPHORBIA SEGETALIS. *Linn. ſyſt.* p. 333. *Ger. prov.* p. 538.
Tithymalus annuus humile flore, lineariſ folio longiore. *Merr.* 3. p. 339. t. 10. f. 2. f. 3.
Tithymalus ſegetum longifolius. *Raj. angl.* 3. pag. 312.

Annua, tota glaberrima, & lacte fcatens candido planta, ex radice fibroſa & ſordide albente caulem orgyalis baſi adſcendentem, hinc erectum, teretem, plus minus pedalem, & ſimplicem. Folia plurima ſparſa, ſubcarnea, acuta, plana, obſcure petiolata, integerrima, foliis ferme duplo breviora. Involucella acuta & ſeſſilia forent late cordata, ſi adeſſet in baſi emarginatio. Flores omnes ſunt fertiles & ſeſſiles. Calyx glaber pallide flavet. Petala quatuor, acute lunata, citrini coloris. Filamenta albida. Antheræ citrinæ, oblongæ, gemellæ. Germen verruculoſulum. Capſula ad oculum nudum glabra, ad armatum rugoſula. Semina pallida. Creſcit in arvis. Floret totam æſtatem; virecque & vegetat in hyemem usque, quando ex alis ramoſior evadit, ipſamque umbellam principem multo etiam acquirit ramoſiorem.

APPENDIX
STIRPIUM EX ALIIS PROVINCIIS, AUSTRIÆ ADJACENTIBUS.

TABULA PRIMA.

GYPSOPHILA PANICULATA. *Linn. syst. pag.* 306.
Affine trutescens, caryophylli folio, flore parvo albo. *Gerb. rar.* 15.

Amicissimus ac reverendus Sigismundus Comes ab Hochenwart ex Hungaria a se inventam, & copiose in campis circa Budam crescentem, mihi oculis, quæ nunc a quinque annis in horto sese vegetat, & annuatim ex radice perennante, crassa, carnosa, solida, albicante natus, foris fusca, & saporis pauci ac subacris caules profert plures, teretes, nodosos, totus humi prostratos, sesquipedales, calamum crassos; inferne villosos, subscabros, ubique atque obsolescius asperos, & simplices; superne glabros. Hi versus medietatem & ultra emittunt ad nodos utrinque aut ex altero tantum latere ut solarium alis ramos adscendentes, alternatim & parentissime ramosos ipsos, pallidos, nitidos, glabros, foliosos, pallentes, tandemque in paniculam florigeram diffusos, dum etiam ipsi in similes paniculas caules terminantur. Unde vix alia planta magis esse paniculata potest, dum densa flosculorum coliors totum arcum tegat. Ex caulis potro aliqua unicum ramum, eumque mediocrem, exeuntem & florere nudo incipientem obtula repræsentat, ex qua facile totius stirpis habitum sibi quis fingat. Ex seminibus ensata planta tertio demum anno floruit, antea dumtaxat caules breves sterilesque genuit. In florente planta folia caulina paulatim marcescunt, & pereunt. Sunt autem folia angusto lanceolata, acuta, uppolita, sessilia, integerrima, crassa, subglauca, ad axas subtilissime & ad lentem caruliginoso - crenata, infima tripollicaria, superiora sensim minora, primi ussi fere omnia & subsequantum caulis intima surfura, reliqua glabra. Pedunculi tunc ramosi. Flores numerosissimi & inodori. Calycis subovati glabri obtusi & obtuse quinquesulcati foliola virent cum ore ad sulcos albidis. Petala alba oblonga obtusa integerrima unque donata brevi & calyce duplo longiora revolvuntur. Filamenta semper numero decem, omnia antheris pallentibus instructa, nec ulla sterilia. Longitudine vero occurrunt diversissima, ita ut in aliis floribus cuncta, ejusdem longitudinis inter se, corollæ revolutæ superemineant, cujusmodi illa flos auctus in caluciæ latus monstrat; in aliis autem quina ad minimum ita sese habeant, dum reliqua numero incerta nec æqua longitudine sint breviora, quæ vero ad priorum normam paulatim increscere suspicor. Etiam stylis longitudo varia est. Pericarpium generis est. Semina minuta valde. Florem pure masculum non vidi. Floret Julio & Augusto. Semina perficit Septembri.

TABULA SECUNDA.

SILENE PUMILIO.
Cucubalus pumilio. *Linn. syst. pag.* 309. *mant. p.* 71.
Caryophyllus sylvestris octavus. *Clus. hist. p.* 285.

Ra-

Radix perennis, digiti auricularis crassitudine, vix spithamam longa, teres, oblique in terram descendens, radiculis sive fibrillis prædita, ex foliis annotinis tabefcentibus circa caput squamata; summa in tellure in latum cespitem caulium simplicissimorum, læto graminis virore oculos allicientem, undique diffusa. Caules alii floriferi; alii, iique frequentiores, foliosi dumtaxat; nulli semisfcerum pollicem longitudine excedentes. Hi ilique semper per terram prostrati, nec nisi apicibus erecti, ut flores aeaules terræ ipsi irradicatos credas. Genicula cauliculorum tria, summum quaternum, brevia, teretia, nuda. Folia radicalia seu cespitis permulta, dense aggregata, simplicia, linearia, obtusa, angusta, integra, nuda, graminis virore, semipollicaria. Caulina ad geniculorum dumtaxat bases opposita, sessilia, sive connato-amplexicaulia, & ipsa linearia, cum modico acumine, angustissima, nuda, dilute virentia, integra, brevia, ad basin in tenera subeim ætate ciliata. Flos terminalis, unicus in quovis caule, erectus, respectu plantulæ maximus, plerumque nonnunquam, cui insidet, cauliculum longitudine excedens. Calyx inferus, cylindricus, subinflatus; quinquedentatus, dentibus obtusis rotundatis brevibus æqualibus; ex viridi tandem nigro-ruber, villis albidis densissimis exstantibus hirsutus. Corolla petalis quinque, in ungues planos, albos, longitudinem calycis æquantes, introrsum basi cannatos, decurrentibus. Limbus erecto-patens, rosei coloris; lobis latis, obovatis cum aliqua emarginatura seu obscure obcordatis, singulis ad faucem denticulis binis longiusculis setaceis initio albis, tum incarnatis, denique albis, instructis, coronulam faucis characteristicam constituentibus. Stamina decem, sub receptaculo affixa; filamentis subulatis, albis, calycis longitudine, alternis paulo brevioribus. Antheræ oblongæ, acutiusculæ, roseæ, tandemque cinereæ, per faucem prospicientes in staminibus longioribus. Germen oblongum, cylindraceum, læve. Styli tres, albi, filiformes. Stigmata simplicia. Capsula unilocularis, trivalvis, polysperma. Odor nullus. Crescit copiosissima in alpibus Carinthiacis summis solo aprico micaceo-arenoso auf den Fladnizer Alpen, Leiterfteig, Winterthal, Eifenhut, Saualpen, Nassfelder Tauern in der Malniz, Spitaler Alpen, & aliis; florens Julio & Augusto. Ad latus adstant petalum, & pistillum, W. *

TABULA TERTIA.

ECHIUM RUBRUM.

Echium creticum. *Hænt. flor. tyrnav. pag. 24.*

Echium rubro flore. *Clus. hist. CLXIII.*

Echium sylvestre hirsutum maculatum. *Bauh. pin. 254.*

Ex Sopronii pratis illustris a Mygind, ex Tyrnaviensi agro clarissimus Chemiæ & Botanices Professor Winterl vivum florensque mihi attulere speciosissimum hocce Echium, etiam aliis in Hungariæ locis copiose crescens. Radix semipedalis, calamum vel digitum crassa, lignosa, intus albicans, cortice crasso atro & inæquali obducitur, sæpe biennis, etiam plures annos durans, superne foliorum præteritorum reliquiis fœdata nigris, infra folia plerumque incurvata. Caulis ut plurimum unicus, in cultis etiam bini vel terni, pedem unum alterumve altus, stricte erectus, firmus, simplex, totus foliosus, pilis albidis hispidus & asper, punctisque atrorubentibus adspersus. Folia sunt anguste & elongate lanceolata, acuta, integerrima, crassa, utrinque pilis densis albidisque tota hispida, dorso dilutius virentia, radicalia in basin attenuata, caulina sessilia. Ex superiorum, successive breviorum, alis exeunt racemi, in se veloci convoluti, paulatim producti more Echii vulgaris, spicam una formantes semipedalem, in individuis altioribus sesquipedalem. Perianthii hir-

 su-

* Ubi litera W subjicitur descriptioni, indicatum volui, & hanc descriptionem, & ipsam iconem pictam archetypam, mecum a reverendo atque amicissimo viro, Francisco Xaverio Wulfen, Botanico insigni, ex Carinthia communicatas fuisse.

ſunt ſoliola: hæc petalo plus quam duplo breviora, æquantque ejusdem tubum. Ex hoc faux campanulata exoritur, in limbum obliquè divisus quinquefidum; cujus laciniæ ſunt triangulares breves & ſubæquales. Totum petalum interne glabrum, externe ad lentem hirſutum & quinque lineis prominulis ſubpentagonum eſt, elegantiſſime ſtriatiſſimeque cum levi purpura rubens, rariſſime colorem carnei, nunquam cærulei aut violacei. Filamenta roſea & glabra corollam ad unam tertiam ſui partem ſuperant, prædita antheris ſubrotundis & cæruleis. Stylus albus pilis longis ſurſum appreſſis ■ apiceo ſtrictus usque obſitus eſt. Semina fuſcescunt.

TABULA QUARTA.

PRIMULA CARNIOLICA.
Primula integrifolia. Scop. carn. 1. p. 133.

Tota planta glaberrima eſt, nullibi viſcoſa aut farinoſa. Differt manifeſte & conſtanter a Primula integrifolia Linnæi, in Auſtriæ alpibus olivia, quod vel ſolo ex flore cognoſcitur. Scilicet in Primula carniolica calyx plus quam duplo brevior eſt tubo corollæ, in integrifolia vix ultra unam tertiam ejusdem partem; eſtque præterea in illa angulatus, in hac tubo corollæ amplior. Laciniæ petali in integrifolia multo profundius ſcantur, ipſæ ſemilibidæ; rubra vero baſi anguſtatur; quæ omnia in carniolica ſic non obtinent. Germen in integrifolia totum viret. Tum ſolia, etiam ex oblongo ovalia & ſubacuta, ſunt ut plurimum obſoletiſſime repanda, nec, uti in integrifolia, tam craſſa vereque integerrima, nec habent ■ oras ciliis ullis. Specimina viva, quæ clariſſimus Hacquet ex Carniolia transmiſit, in horto ſub dio perſistunt, & florent quotannis menſe Majo. Scapus leviſſime angulatus, tenuis, erectus, ſoliis altior, & ad pedunculorum adſcendentium exortum bracteis gaudet veſtitus, in plantis majoribus, meliori ſolo profitentibus, flores gerit a trilus ad ſex, qualis depicta major eſt, in rupibus autem, ex quibus depicta minor eſt, ſæpiſſime unifloras vel biſloras; in culta planta ob unico ad tres flores ſuſtentante. Sunt hi ſuaveolentes, & umbellati. Calycis tubuloſi virentis ſubcarenatique dentículi ſunt obtuſiuſculi. Petalum vere infundibuliforme, nec ■ tubum collo hemiſphærico ullibi donatum, purpuraſcit, aut rubet magis, cum tubo interne albente; itaque limbi laciniæ deſpectæ obverſæ cordatæ obtuſæque. Filamenta alba æque omnium brevitſima inſeruntur corollæ modo ſupra ipſam baſin intra ipſum calycem, modo altius, & vel ad ipſas fauces limbi. Antheræ flavent. Germen depreſſe globoſum ac obſolete quinquefulcatum viret ad baſin, cæterum ex atro purpuraſcit. Stylus purpuraſcit dilute. Stigma capitatum & obtuſum pallide vires. Calyx in fructu inflaſcit, exhibitus ad tabulæ marginem; includitque capſulam ſubrotundam parvam ſtyloque perſiſtente inſtructam, avulſo calyce proxime depictam; ſeminibus ſcatet paucis. Creſcit in Carnioliæ alpibus.

TABULA QUINTA.

FERULA NODIFLORA. *Linn. ſyſt. pag. 209. Scop. carn. 1. p. 204.*
Ferula minor ad ſingulos nodos umbellifera. *Tourn. inſt. p. 321.*
Libanotis quibusdam, flore luteo, ſemine ferulæ. *Raub. hiſt. 3. part. 2. p. 41.*
Libanotis ferulæ folio & ſemine. *Bauh. pin. 158.*
Panax Aſclepium, ferulæ facie. *Lob. ic. 783.*

Ex radice perenni, tereti, longa, uncialis diametri, circulis valde extantibus exaſperata, lutea alba, foris fuſcescente, ſapore aliquo ingrato & ſubacri prædita, tandemque multi-

ri-

cipite, caulis unicus vel plures attolluntur ad humanam altitudinem, erecti, uti tota planta glabri, striati, angulosi, medulla alba duriuscula farcti, superne in pedunculos umbelligeros fere paniculati. Folia caulina infima alterna, subsequa opposita, superiora verticillata; sensim adscendendo multo breviora & minora, ut in summis mera sint foliolis vaginulae fere reflexae. Radicalia & caulina infima longe petiolata; petiolis communibus compressiusculis; costa media in divisione principe triangulari. Sunt autem omnia supradecomposita & ampla; pinnulis extremis setaceo-linearibus, acutis, integerrimis & planis. Umbellae planae nec densae. Involucri universalis foliola reflexa; particularis patentissima; utriusque plura lanceolata & acuta. Radii striati. Petala lutea, revoluta. Pistillum flavescit. Stamina flava inter petala eriguntur. Semina utrinque ovata, obtusa, plana, hinc fusca, inde pallida. Crescit in littorali Austriaco. Floret sub finem Junii & Julio. Semina maturescunt Augusto & Septembri. Ad marginem stat flos auctus; & semen utrinque conspectum in naturali magnitudine.

TABULA SEXTA.

CYPERUS PANNONICUS.

Hanc plantam & sequentem, copiose in littore lacus Peisonis, qui in Hungaria haud procul a limitibus Austriae est, crescentem, Augusto & Septembri florentem, vivam mihi attulerunt ex itinere Botanico illustris Joannes Ingenhousz, archiater Caesareus, & clarissimus Schiwereck; ad quae specimina sylvestria imagines pingi curavi. Natura habitum cultura mutavit. Cyperus hic totus glaber nitidusque est. Radix annua, fibrescens aut rufis, fibrillis constat numerosis longisque, culmorumque gignit caespitem densissimum, inaequalium gradatim breviorum, qui omnes sunt quasi gracile tellum inque ambitum incumbunt, fibrillas etiam novas radicales ex basi emittentes, a semuncia ad semipedem longi, obsolete triquetri, aphylli, ex basi incrassata teretes, & superne solidi. Folium radicale, vaginans culmum ad varium altitudinem, sed eodem multo brevius, lineare, canaliculatum, unicum in culmo florente est; ante cujus egressum pauca brevissima adsunt alia, quorum nunc folae reliquiae conspicuae supersunt. Involucri foliola duo, rarius tria, longitudine inaequalia, spiculis plerumque longiora, similitudinem folii radicalis habent. Spiculae ex ovato oblongae, ternae vel quaternae, umbellatim sessiles, obtusae, compressae, plerumque leviter incurvatae, magnitudine diversae. Squamae membranaceae, subrotundae, obtusae, pallide cum striis viridibus ad dorsi summitatem in acumen concurrentibus. Semina dilute badia, glabra, lateovata & compressa. Caetera ad characterem Linnaeanum sunt. Ad latus exhibetur spicula ad lentem aucta.

TABULA SEPTIMA.

PHLEUM SCHOENOIDES. *Linn. syst. pag. 88.*

Gramiinis species singularis, an Dactylis? *Pall. it. 2. p. 713. t. K. f. 1. & t. Q. f. 2.*
An? Phalaris repens, floribus sessilibus fasciculatis fastigiatis, foliaceo bivalvi compresso obtectis. *Lassl. hisp. p. 114?*

In planta nihil pungentis est, etiamsi rigidula sit. Tota pallide virens, adultior magis glauca. Radix fibrosa, parva, albicans, annua, plures culmos generat procumbentes; ratione ipsius plantae, aut pusillae aut majoris, ab uncia ad decem uncias longos; valde tamen semper longitudine inter se inaequales in singulis individuis; semiteretes, dum latere altero, quo ramulum vel folium inferius spectant, sunt plani; nodosos, geniculatos, glabros, sub-

striatos

ſtriatos, ramisque brevibus axillaribus auctos. A ſpica fructigera ineerta, ſæpe ultro tota germinante, cæſpes denſiſſimus plantulorum enaſcitur, fere eosdem, quæ ſemina in ſpica fuerunt, radices e centro gerentium conſtans. Atque illæ tunc, interiores pallidæ, exteriores longiores, inque orbem omnes ſparſæ, ipſæ numeroſæ simul plantam mentiuntur ſingularem ubicunque. Folia ex lanceolato basi paulatim longeque in acumen definunt, firmula, ſtriata, integra, a dimidia ad duas uncias longa, alternantia, planiſſima vel connivencia, modo glaberrima, modo inferne raciter piloſa, ſpinulis minutiſſimis albidis & ad lenem digitumque deorſum mutum ſolummodo obſervandis in oris nervoque medio dorſali exaſperata; orta ex vagina cylindrica, amplexicauli, ſtriata, pallente, ſuperne & interne barbata, geniculis multo breviore. Flores in capitulum colle&i ſubrotundo-compreſſum & ſolitarium culmos ramosque terminant. Involucri foliola duo oppoſita, baſi concava lanceolatique, & ſeſſilia, cæterum foliis ſimilia, horum longitudinem ærum habent, aut ſunt ipſis vix capitulis longiora. Intra hæc folia nonnunquam folium aliquod peculiare ſeſſile haberur, quod ſinu ſuo capitulum pruſillarum tovet. Receptaculum oblongum & gracile flores numeroſos locat, nullis paleis diſtinctos, omnes hermaphrodites & fertiles. Glumæ ſunt unifloræ, compreſſæ, carinatæ, ad oras ſerrulato-ſpinuloſæ, in dorſo acuto virentes & ex albo ſpinuloſæ, cæterum pallide membranaceæ & ſemipellucidæ, creſtæ, inæquæ; valvula altera breviore & angulatore. Petala ſunt duo, erecta, intus amplexantia, carinata, obtuſiuſcula, ſubpellucida, albida; altero, quod ante glumæ foliolum brevius ponitur, calycem ſuperante, dorſumque compreſſum virens parieraque ſpiculoſum habente; altero integerrimo & breviore. Filamenta duo, (nunquam a me obſervata tria, nec vel ipſa in Palladii cultis vivis plantis,) capillaria, debilia, albida, & corollam ſuperantia, antheras fordide flavas gerunt, lineares, baſi haſtatas, & incumbentes. Germen oblongum, obtuſum, glabrum & petalis duplo brevius vicet. Styli duo, albidi, & capillares, ſtamina longitudine æquant. Semen unicum, oblongum, compreſſum, utrinque obtuſum, ſubpellucidum, glabrum, flore duplo brevius, pallidum cum margine reſpiciente valvulam glumæ breviorem fuſco, coronatum ſtylorum parte ſuperſtite, calyci conniventi inclubitur. Creſcit in littore lacus Peſſonis. Florer a fine Julii ad Septembrim. Semina perficiuntur Octobri. Ad litus repræſentantur noſtra flos in ſtatu ſolito; idem vi explicatus, ut omnes partes in conſpectum prodeant; ſemen; & antea idem hoc in magnitudine naturali

TABULA OCTAVA.

VICIA SERATIFOLIA.

Vicia ſupina, latiſſimo folio ſerrato. *Tourn. inſt. p. 397.*
Aracus ſilvaticus ſerratus. *Bauh hiſt. 2. p. 287.*

Uti videtur, poſt Joannem Bauhinum, qui ab Aggeio ex montibus Euganeis hanc ſe habuiſſe teſtatur, Botanicorum primus denuo excitavit autoptes illuſtris Franciſcus a Myrgind, qui mihi illam recentem adtulit, cupiſque circa Sopronium Hungariæ urbem ad limites Auſtriæ creſcentem. Moriſonus quidem Viciam quandam foliis ſerratis cum Vicia Narbonenſi ceu varietatem interam conjunxit; ſed nec icon nec deſcriptio evincunt, utrum fuerit de hac locutus. Radix annua, albida, ramoſa, & tuberculis more affinium donata, caulem promit ortum altecumve, acute quadrangularem, adſcendentem baſi, inde erectum, unum vel duos pedes altum. Stipulæ ſunt ſubrotundæ & inæqualiter acutiſſimeque dentatæ. Folia infima ſunt binata, ſubſequa bijuga, ſuperiora trijuga aut etiam quadrijuga; cirrus plerumque tripartito terminatus. Caſta eſt angulaſe ſtriata. Foliola ſubovata, obtuſa, argute denato-ſerrata, pallidius virentia, & breviſſime petiolata. Extremi jugi foliolum aliquod ſæpe deſideratur, quamlo ruoc folium pinnatum cum impare videri poſſet. Caulis, coſtæ, & foliorum ora venæque dorſales tam raris tamque ſubtilibus adſpergunter pilis, ut ſu-

fugiant oculum inermem. Pedunculi pauciflori axillis insident breves. Calycis compressi striati & glabri denticulus inferior angustior longiorque reliquis porrigitur. Hujus latera qui claudunt, laterales versus superiora acuuntur; summi duo connivent obiter. Corollæ insignes vexillum ex latissimo & connivente ungue in laminam explicatur erectam, emarginatam cum exiguo mucrone, purpuream cum venis adscendentibus saturatioribus, callosam & originem violaceamque. Alæ ungue gracili longoque instruuntur, baseos segmento introrsum acutato, inferne pallentes cum suffusa purpura; & hinc ad angulum ferme rectum propendulæ atrosanguineæ obtusissimæque. Carina violacea & obtusa ungui insistit longo albo. Glandula characteris Linnæani deest viridis. Germen hirsutum. Stigma barbatum. Legumen, quod maturum videre haud contigit, lateribus glabrum, compresso-planum, polyspermum & oblongum, & utrimque suturam cilia gerit alba, ex lata basi orta, uti ex adjecta aucta leguminis parte patet. Floret Junio.

TABULA NONA.

ERYTHRONIUM DENS CANIS. *Linn. syst. veg.* 241 *Scop. carn.* 1. *p.* 242. *Hall. hist. helv. num.* 1234. *Gmel. sib.* 1. *p.* 39. *t.* 7.
Dens caninus. *Clus. hist. p.* 266.
Dens canis latiore rotundioreque folio. *Bauh. pin.* 87.
Dens canis angustiore longioreque folio. *Bauh. pin.* 87.

Vivam plantam accepi a cler. Hacquet ex Carniolia, in qua provincia, tum etiam in Styria atque Carinthia sponte crescit, florens Aprili. Bulbus oblongus, teres, albus & uncialis, in juvene planta needum florente solum unicum folium radicale producit; postea scapum promit teretem, purpurascentem, solidum, erectum, semipedalem, & inferne foliis duobus oppositis ornatum. Sunt hæc breviter petiolata, glabra, integerrima, acuta, in prona facie ex fusco viridique variegata; lanceolata, oblonga, vel ovata. Flos unicus, terminalis, nutans. Petala ex purpureo rubent, plana; interna simul tubulum brevem interne virentem formantia, dum alterna exteriora incumbunt alternis interioribus; hinc patentissima, eandemque reflexa. Interiora ad basin internam callum album crenatum habent. Filamenta alba, compressa, acuminata, & petalis triplo breviora, sustinent antheras nigras longasque. Germen triquetrum est. Stylus inferne pallet, superne rubet, & crassescit in stigma trifidum.

TABULA DECIMA.

ASTRANTIA CARNIOLICA.
Astrantia minor. *Scop. carn.* 1. *p.* 187. *t.* 7.

Clarissimus Hacquet, Chirurgiæ & Artis obstetriciæ professor Labacensis, plantam vivam cum horto communicavit, quæ nunc, quantam habet, multiplicata, ibidem quotannis sub dio copiose floret. Radix perennis, digiti minimi fere crassitie, unciam plus minus longa, præmorsa, ex nigro fusca, fibris undique capillata nigris longisque, odore gaudet aromatico balsamico, sapore aromatico pauco simulque nauseoso & tandem acri. Tota planta glabra est. Caulis teres erigitur, gracilis, semipedalis vel duplo altior, fere aphyllus, nam unico plerumque folio decoratur, quod modo supra ipsam caulis originem, modo locatur altius, radicalibus simile, aut trilobum dumtaxat, etiam simplex. Caulis ipse superne in ramos trinos & sæpe subdivisos umbellatim solvitur. Ramus medius quoque adest frequenter indivisus. Umbellarum hinc numerus variat a sex ad viginti octo. Ramosiorem

Scopoliana figura mobilitat, ampliciorem caulem mea. Ad ramulos bracteæ exiguæ ovatæ concavæ obtusæ pallidæque locantur. Involucrum universale constat foliolis a duobus ad quinque, sessilibus, acutis, raciter serratis, integris vel semibifidis trifidisve. Umbellulæ parvæ habent involucri proprii foliola a sex ad duodecim, ex oblongo lanceolata, integerrima, acuta, patentissima, alba cum linea media virente, & sui longitudine. Flosculi insident pedunculis propriis capillaribus & [illegible] lentem tuberculato-rubris; masculi plures longioribus; fœminei sine certo sui imminei brevioribus. Petala alba, ob apicem valde inflexum cordata, erectiuscula, in utrisque marcescendo persistunt. Perianthii proprii foliola sunt ovata, concava, albida, & fere longitudine corollæ. Stamina corollam æquant. Germen hirsutum pallet cum aliquo virore. Semina gemella, ovalia, calyculi externi parte coronata, hinc glabra & planiuscula cinerascunt, illinc convexa muricatæque albent. Floret Julio & Augusto. Adduntur ad latus semen in naturali magnitudine; cum aucta flos, semina utrinque conspecta, eorumdemque sectio transversa.

TABULA UNDECIMA.

ASTRANTIA EPIPACTIS. *Scop. carn. 1. pag. 185. n. 6.*
Sanicula involucris maximis quinquefolia, seminibus tuberculosis. *Hall. enumer. pag. 67.*
Helleborine. *Tabern. ic. 84.*
Helleborine sanicula facie. *Bauh. pin. 186.*
Alpina Helleborine, Sanicula & Ellebori nigri facie. *Lob. ic. 664.*
Epipactis. *Matth. in Dioscor. pag. 721.*

Florentem vivum clarissimus Hacquet ex Carniolia transmisit. In Hungariæ Comitatu [illegible] trienni primus beatus Lipp eandem invenit. Radix perennis, intus pallens, foris nigra, colorum crassa, cornuta, obliqua, ramosa, sapore subacri ingrato tandemque extiscante prædita, paucas uncias longa, fibrisque crassis longis & nigris jubata, aliquot e capitibus inter squamas geminas oppositas concavas & rubentes foliorum unicum unumque scapum florentem producit. Hic modo una cum folio adest, modo folio præcocior est. Folium glabrum innititur petiolo semipedali, acute trigono, & inferne purpurascenti; rotundatum & ad basin usque in tres partes divisum; dimidium, argute serratum; foliolo intermedio breviter trilobato; lateribus profunde bilobis. Lobulis hinc ipsis diversimode brevioribusque aut trifidis, aut bifidis. Scapus glaber erigitur ad folii circiter altitudinem, semipinnatis involucris plerumque pentaphyllo, interdum hexaphyllo, & eodem numero angulatus. Foliola involucri setilia patent, obverse ovata, supra medium serrata, obtusa, & pallidius virentia. Flosculi exigui in capitulum parvum dense collecti occupant centrum involucri. Ex his alii, qui sunt pedicellati, masculi gemine careut, hinc steriles. Alios sessiles hermaphroditos, numero pauciores, vidi, fertilesque omnes; quibus mere spinoso clarissimus Scopoli adnumerat, quos mihi videre hauc contigit. Utrisque foliola calycina sunt quinque, ovata, acuminata, concava, pallide flavescentia, & petala. Petala etiam quinque, sublanceolata, flava, erectiuscula, calyce duplo longiora, apicem oblongum acuminemque gerentia quam maxime inflexum. Hæc inter, extrorsum magis, erigunter filamenta quinque subulata longa, quibus antheræ oblongæ fulgurantesque incumbunt. Hermaphroditi stylum habent duplicem, filiformem, & utrinque reflexum. Semina lutea, ovata, hinc gibba, & rugose striata, illinc sulcata, calyce & stylo persistentibus coronata, inodora & fere insipida. Ad latus seorsum aucta sistuntur flos masculus integer, petalum, pistillum cum calyce ex flore hermaphrodito, semen unum ejusdemque transversa sectio; denique in magnitudine naturali semen.

TA-

TABULA DUODECIMA.

TUSSILAGO SYLVESTRIS. *Scop. carn. 2. pag. 175.*

Novam plantam, quam vivam ex Carniola a clarissimo Hacquet accepi, tum etiam ex Styria habui, clarissimus Scopoli primus proposuit, non bene conjungens cum Linnaeano Hallerianoque synonymo, quem errorem secutus fui in Florae Austriacae tabula ducentesima quadragesima sexta, ubi ex Tussilaginis alpinae synonymis plantam hanc Scopolianam, tunc nedum mihi visam, expungi debet, manente autem Halleriana Linnaeanaque. In Carniolae sylvis, atque Styriae montosis fagetis crescit, florens Majo. Radix crassa, perennis, fibris subtus pluribus. Folia generat pauca, longe petiolata, ex reniformi subrotunda, superne glabra, tenuia nec crassa; subtus & ad nervos praesertim [illegible], adulta sex [illegible] villosa; obiter septemlobata, lobis inaequalibus & acute dentatis; utrinque virentia, dorso pallidiora quidem, nunquam tamen hic incana. Folia caulina a duobus ad quinque; inferiora petiolo latissimo connato & amplexicauli [illegible], lobata incisa; summa sessilia lanceolata & integra. Caulis teres, semipedalis vel altior, & villosus, erigitur, terminaturque plerumque unico, erecto & inodoro, cui quandoque ex foliorum summorum alis alii pedunculati unus alterve accedunt. Calyx inferne virens, superne purpurascens, constructus ex foliolis lanceolato-oblongis, acutis, glabris, circiter quindecim. Flosculi feminei [illegible] petali in ambitu circiter dena. Hermaphroditi circiter triginta quinque [illegible] habent [illegible] quinquefidumque. Antherae ex [illegible] purpureae. Stigmata [illegible]. [illegible] feminea [illegible] & papposa. Ad latus sinistrum folium varium ex alia [illegible] plantae; cum parte caulis striati.

TABULA DECIMA TERTIA.

LIGUSTICUM PELOPONNESIACUM. *Linn. spl. p. 211. Scop. carn. 2 p. 205.*

Ligusticum foliis duplicato-pinnatis; pinnulis acute dentatis, longe lanceolatis. *Hall. helv. n. 758.*

Seseli Peloponnense. *Cam. epit. p. 51.*

Cicutaria latifolia foetida. *Bauh. pin. 161.*

Cicuta latifolia foetidissima. *Moris. umb. p. 18. t. 6.*

Radix perennis, odorata, & saporis acris [illegible] diu persistente [illegible], longa, pollicem [illegible], crassiora, fungosa carnosa, alba, vestita cortice membranaceo [illegible]. Caulis pedaneus & ultra crassus, amplius [illegible], teres, [illegible], ramosus, & crescentes, ad tertium vel quintum pedem altitudinem assurgit. Folia radicalia & caulinum inferius sunt tripinnata & circumscriptione amplissima. Tum caulinum praeterea adest superius [illegible] bipinnatum. Summa quandoque opposita sunt, vel & terna aut quina. Pinnae sunt pinnatifidae, longe lanceolatae, confluentes & acutae; quaedam etiam quandoque sessiles ad costarum divisiones. Costae teretes, striatae, crassae, & fistulosae. Umbella caulina terminalis, erecta, ampla, densa, convexa, [illegible] florens. Aliae axillares ex foliis, hinc interdum verticillatae, minores, modo ultra primariam elongatae, modo breviores, saepe abortientes ob defectum germinis aut [illegible], aut ex parte. Pedunculi sunt patentissimi. Radii florum a viginti quatuor ad quadraginta. Involucri utriusque foliola circiter quina, angusta & inaequalia. Petala pallida, ovalia, acuta, patentissima vel reflexa, apicem gerunt quidem inflexum, nec tamen cordata. Filamenta albida cum virore aliquo & patentissima corollam superant. Antherae & [illegible] germen flavent. Styli subulati elongantur. [illegible] compressus & glaber dispescitur in

semina oblonga, fusca, intus plana breviterque bimarginata, extus tribus alis donata, saporis aromatici nec grati. Tota planta glabra est, & etiam olet quidem, at non foetet. Floret Majo & Junio. Semina maturescunt sub finem Julii. Cultam in horto descripsi, & pingi curavi. Ad sinistrum latus sistitur radicis portio cum fecedente caulis parte. Dein flos auctus; semen in nativa magnitudine, utrinque conspectum; & hujus sectio transversa.

TABULA DECIMA QUARTA.

EUPHORBIA CARNIOLICA
Tithymalus glabus. *Scop. carn. 1. pag. 336. t. 21.*

Clarissimus Scopoli solus, opinor, hujus plantae mentionem fecit, cujus nomen, quia ipso Linnaei non est, substitere non potuit, quare novum imposui. Vivam a clarissimo Hacquet habui, quae culta in horto jam ab aliquot annis habetur nec mutavit, fructum tamen maturum nullum dedit. Lacte candido, nec acri, tota turget. Ex radice perenni, crassa, nodosa, foris nigricante, inaequali, obliqua, fibrisque crassis aucta, caules herbacei, annui, plures, teretes, rariter subpilosi, simplices, spithamaei, alii floriferi, alii steriles, eriguntur. Folia sparsim decussantur, obovato lanceolata, mollia, integerrima, obtusiuscula, patentissima, in brevem petiolum attenuata vel subsessilia; pilis mollibus oculoque nudo vix conspiciendis ciliata, in dorso itaque margine pluribus, in facie raris. Umbella terminalis quinquefida sit ex radiis debilibus patenti simis ferreque cernuis, cum pedunculo centrali unifloro etiam cernuo. Radii bifidi in dichotomia quoque pedunculum continent. Involucra & involucella sunt ovato-lanceolata & acuta, caeterum foliis similia. Ex foliorum summorum axillis ramuli etiam exeunt breves bifidi & longique. Calyx campanulatus, pallide flavet, plusque albis pubescit, quinquedentatus denticulis emarginatis & acutis. Petala omnibus sunt quina, semirotunda, integra & lutea. Antherae globosae, didymae & subvirides, inhaerent filamentis pallidis & geniculatis. Germen est muricatum. Flores plerique dichotomiarum germine carent, propterea masculi & steriles. Capsulam, quam non vidi maturam, clarissimus Scopoli dicit verrucosam. Floret Aprili & ineunte Majo. Crescit circa Idriam. Ad latus flos sistitur auctus.

TABULA DECIMA QUINTA.

DIANTHUS VIRGINEUS. *Linn. syst. pag. 308.*
Tunica virginea. *Scop. carn. 1. p. 302.*

Specimina sicca & semina misit ex littorali Austriaco clarissimus Brufati amicus, quae, dum terere, altera tertio anno florentem protulere plantam in tabula exhibitam, a siccis speciminibus non discrepantem. Dupla breviorem postea habui ex Tyroli a clarissimo Schivereck. Tota planta glabra est. Radix perennis rufa & lignosa caules annuatim gignit plurimos, herbaceos, teretes, erectos, plus minus pedales, aut unifloros, aut ex alis supremis unum adhuc alternatim florem pedunculatum gerentes. Folia sunt linearia, acuminata, canaliculata, per microscopium ad oras denticulata, caulina opposita basique connata. Flores inodori. Calycis squamae quatuor, rotundato-acuminatae, breves, duae exteriores saepe ab interioribus remotae, nonnunquam ad illam distantiam, ut foliorum caulinorum speciem breviorum prae se ferant. Ipse calyx tubulosus breviterque quinquedentatus. Petalorum unguis albus; lamina rubra & crenulata, nullos ad faucem pilos gerens. Stamina & stylus albent. Capsula crassa rigida & ad apicem quadrivalvis continet semina plura nigra & plana, matura Augusto. Floret Junio & Julio.

TA-

TABULA DECIMA SEXTA.

ECHIUM ALTISSIMUM.

In Comitatu Hungariæ Nitriensi ad viam, quæ Posonio Schemnitzium itur, crescens inveni locis campestribus siccis, ubi Julio floret, semina ferens mense Augusto. Vivum habui, ut depingi poterit, a clarissimo Wenzl. Radix plerumque biennis, interdum ex caule decessi futura annotine, primo anno sola folia radicalia producit. Caulis erigitur, in sylvestri planta semper a me observatus unicus, teres, per maximam fere partem æqualiter floridus, a tribus ad quinque pedes altus; in culta (tunc sæpe multicaulis) etiam sex superans. Folia sunt lineari-lanceolata, acuta, saturate viridia, crassiuscula, integerrima, sessilia. Hæc utrinque & ad oras, caulis, bracteæ & calyces, pilis albis dense hispida sunt, vix tamen pungentia. Pedunculi communes axillares, secundi, multiflori & conjugati. In bracteis lanceolatis & acuminatis sessiles & solitarii. Corollæ infundibuliformis & perpetuo albæ tubus fere cylindricus et longitudine calycis. Limbus tubo brevior & patens, modo æqualissimus, modo obsolete subbilabiatus; divisus in quinque lacinias ovatas & obtusas. Filamenta alba & declinata corollam fere ad duplum superant. Antheræ cum tempore flavescunt. Stigmata bifidi extremitates sunt albidæ. Semina fusca, ovata, acuta, angulata & muricata. Tabula repræsentat eandem breviorem plantæ, ad sesquipedalem a radice distantiam abscissam. Altius etiam nascitur, si quis superiorem alterius depicti caulis partem ad sesquipedem ultra elongatam sibi fingat. Ad lævum latus racemus conjugatus, post flores defluxos ulterius jam evolutus; dein corolla lateraliter, eademque antice conspecta.

TABULA DECIMA SEPTIMA.

LONICERA CÆRULEA. *Linn. syst. p.* 166. *Scop. carn.* 1. *p.* 154.
Caprifolium foliis ovatis; bacca singulari, ovali, bilobo. *Hall. hist. helv. num.* 673.
Periclymenum rectum tertium. *Clus. hist. p.* 58.
Chamæcerasus montana, fructu singulari cæruleo. *Bauh. pin.* 451.

Planta hortensis depingitur, quæ sponte in montosis & subalpinis Carnioliæ, Styriæ & Tyrolis crescit. Culta hic vegete, florens Aprili & Maio ineunte, baccas suas tamen Majo maturans. Frutex multicaulis ramis glabris teretibus & ex fusco rubentibus, junioribus pilosis, adultis glaberrimis. Folia sunt opposita, breviter petiolata, ex ovato oblonga, obtusa, integerrima, venosa, subtus pallide virentia, & glabra. Hæc tamen in ramis novis atque junioribus ad oras, nervum dorsalem, petiolosque sunt ciliata, opposita jam in ipsis stipulas sive gemmas eas, subulatas, aculeiformes, molles, patentes, referentes cum summitatibus pallidis, adversus longiores. Petioli etiam horum foliorum connectuntur stipulis subrotundis ciliatisque. Pedunculi uniflori, solitarii, axillares, breves, teretes, glabri & oppositi nutant. Germen unicum, integrum, subrotundum, compressissimum, coronatum limbo exiguo gemelli quadridentato, fultum inter binas bracteas setaceas & pilosas. Corollæ geminæ, ochroleucæ, infundibuliformes, extus rarius pilosæ, basi gibbosæ, altera paulo breviore solo in idemtes germine, limbum induunt velut barbatum; cujus labium superius sæpe tamen bidentatum est, quadrique protrahens meditur sennæ adsedit labii inferioris, laciniis eas sublongius habentis. Filamenta inferne hirsuta, & antheræ donata oblongis flavis atque erectis, æquant longitudine petalum, cujus & ulus admittuntur. Stigma crassum. Bacca disseminatur persistentes vel subrotunda, saturate cærulea, similique rore perfusa albido, margine calycinis emarcida coronatus, ascendque ad latus crescente amplior, pulpam includit purpuream acidulamque. Semina elliptica ovata, plana, nitida & flavescentia.

TA-

TABULA DECIMA OCTAVA.

ARETIA ALPINA. *Linn. Syſt. p. 151.*
Arctia ſolis ovatis, repandis; ſcapis unifloris. Hall. [illegible] helv. num. 618 t. 11.

Summitis in alpibus, ſteriles amplidſimis, perquam copioſe habitare ſolet, plantularum elegantiſſima. Initia Junii in ſupremis Folkerstenſium alpium jugis florentem legi. Alias itidem in principio menſis Julii in Eladinenſibus ſummitatibus circa Leiterſteig, & quas jure ſcalares ſummitates dicas. Tum in excelſo Winterthal; Eiſenhut Carinthiacus [illegible] Styriacus, &c. Undique flore rubro, ſcapis jam exiguis, aliis elatioribus; [illegible] in ipſa ſummitate Eiſenhut people pyramidem, e ſuperimpoſitis ſemper lapidibus exſtruſtam, flore nivco. Locis ſemper apricis gramineis. Dubius longiuſcule merebam, unamne an tres ſpecies ſtatuerem? Non ſola Halleri auctoritas, quamquam maxima, ipſa me denique autopſia ductus, omnes tres easdem duntaxat eſſe ſpecies varietates. Nivea varietas media colore eſt inter rubram majorem & minimam; plerumque ſegmentis corollarum ipſis in apice crenis minutis incifis; ſed tamen & penitus integris invenitur. In varietate rubra ſegmenta plerique integra, quandoque emarginata inveni; uti hæc omnia ex figuris videre licet. Folia quoque omnibus eadem, denique magnitudine. Villi, licet minimi, & fere procumbentes, tamen & in foliis omnibus adſunt, nifi cum tempore & ætate plus minus evaneſcant. Id ſolum peculiare habet varietas nivea, quod annulo flavo ſaux coronetur. Sed etiam in rubra varietate haec ſæpenumero rubet. Minimam rubram varietatem non adjici, quod ſola parvitate differat, ipſum majoribus ſolo tribuere queas. Radix perennis, utcunque gracilis, ſub ipſis jam terræ rimaſſimæ caulifera, ita, ut ex una perſæpe radice, nec ea maxima, ingens tamen cæſpes terram late ſternat. De caulibus nihil ſupra terram eminet præter aggregatas dumtaxat & fedifermes quidem foliorum patentium rofulas. Sunt vero caules ſub terra ſeminales foliorum ſuperiorum annorum foliis imbricatim veſtiti. Folia ſunt oblongo-ovata, aut oblonge lanceolata, ſeſſilia, plana, integerrima, læte virentia, initio denſe villoſula, cum tempore ſupra fere glabriuſcula; oris ciliatis. Scapi modo ex rofulorum centro, modo de lateribus caulis; nunc plures, alias pauciores; in minimis individuis aliquando duntaxat vel trium linearium, in maximis etiam pollicares; ſæpe graciles admodum, ac in ſanctia etiam pube nonnulla ſubtiliſſima ſuperinducta; rubra in varietatibus ſuis, in albis virides; erecti cum apice ſubnutante, uniflori. Calyx tubuloſo-ſemiquinquefidus, nunc villoſulus; laciniis dorſo carinatis, & acuminatulis. Tubus corollæ calyce brevior amabilem cyclindricum efformat. Sub fauce ſtamina inſigniter quinque; quorum filamenta tubulata, minima, alba. Antheræ oblongæ, flavæ. Limbus corollæ quinquepartitus, planus, fauce parva; ſegmentis oblongo-tuborvatis, rotundatis, integris, cum minima quandoque crenula in apice excifa. Germen in fundo calycis ſeſſile, ſtrictum depreſſiuſculum, dein glaſtulatum, denique oblongo-ovatum. Stylus ſtamina æquans, rectus. Stigma obſcure trifidum. Capſula unilocularis, polyſperma, apice dehiſcens in valvulas quinque divergentes, intra calycem perſiſtentes. Odor plantæ nullus. *W.*

TABULA DECIMA NONA.

INULA BUBONIUM.
Aſter Bubonium. Scop. carn. 2. pag. 173. tab. 58.

Clariſſimus V. Bruſius plantam ipſam florentem, ſeminaque attulit ex littorali Auſtriaco, quæ læta primo ſuo anno flores dederunt. Icones ad ipſas plantas ſylveſtres pictæ ſunt, alteram ramoſam, caule ſimplici donatam alteram. Tota ſubodorata eſt, ſapore quodammodo ingrato. Radix perennis, numeroſis conſtat fibris craſſis longisque, quæ ex capite cum-

communi caules promunt plures erectos, sesquipedales, subteretes, foliosos, modo simplicissimos paucisque floribus pedunculatis terminatos, modo ex pluribus foliis ramulos simplices & axillares emittentes. Folia sunt lanceolata, acuta, sessilia, alterna, rigidula, denticulata, summa integerrima. Caulis, rami, & folia ad oras imprimis & nervum dorsalem villos habent, magis minusve conspicuos. Calycis glabri squamæ sunt subovatæ, infimæ foliaceæ, omnes (intimis acutioribus exceptis) squarrose ad apicem patentes. Corolla lutea. Ligulæ radii sunt acutæ & minutim tridenticulatæ. Antheræ lorum generis halbæ. Semina lineario, fusca, striatoque, pappo coronantur pilosо, sessili, ad lentem villoso. Floret Augusto & Septembri.

TABULA VIGESIMA.

LILIUM CHALCEDONICUM. *Linn. Syst. p. 240. Scop. carn. 1. p. 240.*
Lilium rubrum sive miniatum Byzantinum. *Clus. hist. p. 131.*
Lilium Byzantinum miniatum. *β*
Lilium Byzantinum miniatum polyanthos. *ε*
Lilium purpureo-lingulneum, flore reflexo. *Bauh. pin. 78.*
Hemerocallis calcedonica. *Lob. ic. 169.*

Diversis annis, diversis in montibus inveni, pleramque uniflorum, etiam biflorum, rarius tri- & quadrifloruin, semper in summitatibus prægrandium nigrorum; Slanizæ aut Slavinæ supra lacum Zirchnitzensem prope Planinam; Utoskæ inter Pilichgrat & Bischofitz; in vertice Joibl inter Carniolam & Carinthiam. Ii paulo supra interiorem columnam conflatam in folvulum divertebris; tum in alpibus Lithopolitanis supra SS. Primum & Felicianum. Et alibi. Bulbus profundus, oblongo-ovatus, constans e squamis squamis cornolis, albis, lanceolatis, laxe imbricatis, & rectis, basi funiculorum modo demittentes fibras teretes fordide ex albido fuscescentes. Caulis e centro bulbi erigitur ad duas supra terram spithamas, infra terram albus, duplici verticillo thecillarum ex albo tandem nigrescentium coronatus; inde ad dimidium trium pollicum sanguineus, & macula saturatioribus variegatus; tum ad verticem usque viridis, & dense foliatus; externum semper, teres, fistulosus, glaber. Folia dense per caulem sparsa, erecto-patentia, lanceolata, integra, sessilia, supra plana & nuda ac nitentia, subtus multinervia, nervis & oris pro totius longitudinem albo-ciliatis. Flos superbe elegans, insignis, nutans, petalis sursum revolutis. Flores, dum plures, singuli pedunculati pedunculo basi aut supra basin bracteæ vel foliolo brevissimo stipato. Calyx nullus. Corolla hexapetala; petalis lanceolatis æqualibus, tribus interioribus, duplicis aut minimis aut nonnullis (duplicis enim coloris inveni,) a basi ad medium in cylindrum conniventibus, inde ad apicem sursum revolutis; externa parte lævi & pallidiore, interna pagina vero saturatius colorata, basin versus canaliculata, inde ad apicem foliis longitudinalibus exarata, carinulis carunculato-tuberculatis, tuberculis oblongis ex nobro vel aurantiaco tandem atris. Pubes sive tomentum fugax petalorum apices occupat, quo ante explicationem in cylindrum angulosum petala coiberent. Stamina sex corollis breviora, erecta, ex viridi luteiscentia, subulata. Antheræ longæ, in media staminibus affixæ, fatiscentes petalis ipsis colorisque. Germen oblongum, obtuse hexagonum, basi strongulatum magis quam apice, læve. Stylus crassus, minus tamen quam germen; in cylindraceo magis magisque, tamen semper obtuse, trigonus, in stigma demique abiens obtusum, crassum, trigonum, ex luteo rubens. Capsula oblonga, turbinata, fulcis levis percursa, apice tricuspidem dehiscente, obtusissima, trilocularis. Semina copiosa, plana, orbiculata, extrorsum a fulco valvulæ seu paricitis intrante excisa sive emarginata, colorie ferrugineo-brunnescentia. Odor lutens, gravis, molestus, ut nuper, a Scopolio dici potuisse, narcoticus olere. Floret Junio; in alpibus Julio; annis insuetius calidis etiam Majo. W.

TABULA VIGESIMA PRIMA.

CARDAMINE RESEDIFOLIA. *Linn. syst. pag.* 812.
Cardamine foliis radicalibus petiolatis, ovatis; caulinis pinnatis obtusis. *Hall. hist. helv. num.* 476. β.
Nasturtium alpinum minus, resedæ folio. *Bocc. mus.* 2. *p.* 41. *t.* 36. *Bauh. prodr.* 45. *pin.* 104.

Frustra Hallerus, licet summus in omnibus, contendit cum bellidifolia Cardamine conjungendam esse. Rarius utraque, eadem in alpe, invenitur. Pinnata folia haudquaquam ætatis dumtaxat soboles dici possunt. Resedifolia, cui caule sit dimidii pollicis, semper foliis integris, trilobis, pinnatisque gaudet; quod in bellidifolia, nisi spithamam attingat, & jam semina perficiat, nusquam contingit. Praeterea resedifolia plerumque ramosissima est, licet parva admodum; cum tamen bellidifolia simplicissimum caulis non deserat. Radix in resedifolia longa, filiformis, ex albido subargillacea; licet utcunque tenuis, perennans tamen; oblique eum ad horizontem repens, apice multiceps; ex quovis capite, dum plura adsunt, multicaulis; caulibus persæpe radice ipsa brevioribus, plerumque ramosissimis, densissimis, vix unquam dimidiæ spithamæ altitudinem attingentibus, teretibus, subtilibus, levibus, imo nitentibus, ex viridi saepius atrocærulescentibus. Folia radicalia confertissima plurimaque, longe petiolata, subrotunda, ovata, obtusa, integerrima; basi ipsa, unde petiolus exit, frequenter nonnihil emarginata, ut subreniformia dici possint. Caulina inferiora, maxime quæ radici propiora sunt, itidem longe petiolata, [illegible] lyrato-hastata, nec aliter triloba; lobis planis, rotundis, extimo majore; superiora caulina petiolata, pinnata; jugis pinnarum plerumque duobus, rarius tribus, cum impare; pinnis linearibus, obtusis, integerrimis, extima impare oblongo-obovata. Ceterum folia omnia plana, levia, subnitentia, nonnihil firma. Racemi terminales. Flores singuli proprio pedicello donati, erecti. Calyx tetraphyllus; foliolis oblongo-ovatis, obtusis, concavis, corolla duplo brevioribus, cum pallido virore subcærulescentibus, tandem subflaventibus & deciduis. Corollæ niveæ, tetrapetalæ; petalis obovato-oblongis, integris, erecto-patentibus. Stamina tetradynamia, calycis longitudine. Filamenta subulata, alba. Antheræ flavæ. Germen oblongum, subcylindraceum, læve; stylo vix ullo; stigmate subcapitato, truncato, subflavescente. Siliqua fere pollicaris, linearis, plana, ex seminibus prominentibus torulosa, bilocularis, bivalvis; valvulis extus atrocærulescentibus nitentibus; dissepimento valvulis parallelo, utrinque protuberante. Semina copiosa, lentiformia, valvulis a basi sursum revolutis elastice ejecta. Odor plantæ nullus. Crescit perquam copiose, & floret initio Julii in apricis graminosis dumulosis summarum alpium Fladnizensium, Leiterstein, Winterthal, Eisenhut, tum & in summitate alpis Grünpichel Styriæ, item in Reichenau in alpe Gotton; nec non in Taurero Nassfeldensi. Ex alpib. W.

TABULA VIGESIMA SECUNDA.

GEUM REPTANS *Linn. syst. pag.* 352.
Geum foliis pinnatis, trilobatis, incisis; flagellis reptans. *Hall. hist. helv. num.* 1132.
Caryophyllata petræa major. *Gesn. ic. lign.* 137.
Caryophyllata alpina tenuifolia incana, flore luteo, longius radicata. *Barr. ic.* 400. *Bocc. mus. p.* 116. *t.* 128.
Caryophyllata alpina, apii folio. *Bauh. pin.* 322.

Picta icon & descriptio a reverendo Wulfen missæ fuerunt, qui abunde crescentem invenit florentemque mense Julio in abruptis præcipitiis summarum alpium Wincherthal &

[illegible]-

Eisenhut, tum etiam solo arenoso glareosi supremarum viarum cavarum Carinthiam inter & Styriam supra alpes Fladnizenses. Ex alpibus Carpaticis mihi clar. Lipp attulit, ex Tyrolensibus clar. Schwereck. Radix teres, flavens, multiceps, radiculis instructa, ac obvoluta exuviis semicalidis foliorum praeteritorum annorum; proferens simul copiam foliorum, scaporum, flagellorum repentium. Flagella longa, teretia, rubra, villis inspersa, per intervalla fibrillis terrae inradicata, nec foliis destituta, licet multo minoribus, continuisque tamen caulis, quae sive de radice, sive de scapis exeruntur. Folia radicalia omnia pinnata; axe communi pinnarum villoso, ex viridi tandem rubente; pinnis sessilibus, imbricatis, uniformibus, subcuneiformibus, tri-quadri-vel quinquefidis, supra nudis, subtus pilis villosis, tum etiam glanduliferis, & incanescentibus. Praeter has pinnas affixa tunc axi communi versus basin foliola sive pinnulae aliae, multo reliquis minores, simplices, ovato-acutiuscula, fere alternae, sessiles, a se invicem sejunctae. Scapi erecti, rubentes, teretes, villosi, duo aut tria folia spuria, sive potius bracteas, proferentes. Bracteae hae sunt alternae, sessiles, oblongae, subtus villosae, non tam pinnatae quam potius pinnato-dentatae, dentibus lineari-lanceolatis integris. Petiolus his nullus, sed eius loco bracteae sessilis inter stipulas binas amplas, ovato-lanceolatas, integras, subtus villosas. Flos in quolibet scapo major, terminalis, erectus, aureus. Calyx monophyllus, semi-decemfidus, seu in quinque lacinias lanceolatas, integras, alternas breviores, sic profunde divisus, coriaceus, extus saturate ex nigro ruber, villosus. Petala quinque ad octo, etiam dena, magna, aurea, staminibus elongata, calyce majora. Stamina calycina plurima longitudine calycis, una cum antheris aurea. Receptaculum in centro calycis sessile, erectum, oblongo-ovatum seu ellipsoideum, hirsutum, villis albidis. Germina sessilia, in capitulum collecta, plurima, ovata, dorso externo convexa, lateribus introrsum in centrum convergentia aut compressa, adeoque subtriquetra, hirsuta villo consimili. Stylus longissimus, lateri germinis ad apicem interius, a basi ad medium villosus villo albido sericeo, inde ad apicem nudus, flavens. Stigma simplex. Semina, qualia germina sunt, cum stylo persistente, in medio infracto, seu potius geniculato-aristata.

TABULA VIGESIMA TERTIA.

SAPONARIA OCYMOIDES. *Linn. syst. p. 307. Scop. carn. 2. p. 51.*
Saponaria caule decumbente, nodoso; foliis ovato-lanceolatis; calycibus cylindricis, hirsutis. *Hall. syst. helv. num. 909.*
Saponaria minor quibusdam. *Bauh. hist. 3. p. 344.*
Lychnis, vel ocymoides repens, montanum. *Bauh. pin. 206. Seg. ver. 1. p. 430.*
Ocymoides repens, polygonifolia. *Lob. ic. 341.*

Crescit copiose, & floret a Majo ad Augustum in Carinthiae valle Gilleni rora; in valle Canalensi; circa Leontium in Tyroli conterminis; Malborgetti versus Clausen in valle frigida; Pontebae in monte sancto Luschariensi. Delectatur solo duro arenoso umbroso silvarum. Odor nullus. Radix lenta, fusiformis; etiam ramosa; longa, repens, radiculis undique copiose crinibus instructa, cespitulum persaepe integrum suo e capite educit caulium. Hi vix spithamaei, procumbentes, ex dichotomiis paniculati, teretes, ex viridi rubentes, villosi, geniculorum aliquot. Folia ad geniculorum nodulos tantum, opposita, connato-sessilia, obovato-oblonga, obtusiuscula, in petiolum velut decurrentia, gramineo-virentia, integerrima, nuda, oris duntaxat basin versus ex pube ciliatis. Flores eo prorsus modo, quo in Silenis id fieri assolet, per dichotomias suspenduntur erecti, singuli pedicello brevi rubeo villoso fulsulti. Calyx in florescentia cylindricus, coriaceus, ruber, albido-villosus, quinquedentatus, persistens; in fructu obovato-clavatus. Petala quinque, quorum ungues albi, plani, longitudine calycis; lamina vero limbi patentis oblongo-subovata, integerri-

 ma,

na, supra pallide rosea, ac demum saturatius rubra, subtus albido-rubella. Faux cujusque petali denticulis binis parallelis ex albo rubentibus, haud aliter quam in Silenes specie aliqua. Stamina decem; filamentis albis, calycem nec petala excedentibus, alternis petalorum basi affixis paulo altioribus, alternis de receptaculo exortis brevioribus. Antheræ subcordatæ, cinereo-cærulescentes. Germen subpedunculatum intra calycem, cylindraceum, glabrum. Styli duo, albi, paralleli; stigmata simplicia. Capsula obovato-clavata, subquadrangula, unilocularis, quadrivalvis. Semina orbiculato-reniformia, columnæ quadrato-pyramidali in quatuor lateribus ex pedicellis minimis affixa. W.

TABULA VIGESIMA QUARTA.

TORDYLIUM NODOSUM. *Linn. syst. p.* 205.
Caucalis nodosa. *Scop. carn.* 1. *pag.* 192.
Caucalis nodosa, echinato semine. *Bauh. pin.* 153. *prodr.* 80. *hist.* 3. *p.* 83.

In Istria & littorali Austriaco spontanea hæc planta occurrit; quæ ex radice annua & gracilescente fusiformi unum vel plures caules promit erectiusculos vel inclinatos, parum ramosos, teretes, striatos, graciles, ad tactum nonnihil asperos, uti tota planta, nec tamen manifeste hirsutos. Folia sunt subbipinnata, circumscriptione oblonga; costa striata, antice sulcata, ad basin dilatato-membranacea; pinnulis laciniatis, acutis. Umbellæ florentes terminales & fere sessiles ad summa folia; quæ caule & ramis elongatis, nunc fructigeræ, conspiciuntur ad nodos oppositæ foliis, & longius nunc pedunculatæ. Ceterum sunt difformes; universales nullo involucro fulfultæ; particulares geminæ vel ternæ, donatæ foliolis involucri plusculis linearibus & acutis, flores densissime congestos gerentes. Flores sunt exigui, omnes fertiles. Germen magnum, oblongum, setis albis adscendentibus hispidum. Petala alba, ovata, apicem acutum inflexum habentia. Antheræ pallent. Semina hinc convexa & hispida pilis uncinatis, inde plana. Ad latus exhibentur flos auctus, semen utrinque spectatum in nativa magnitudine, & seminis aucti sectio transversa.

TABULA VIGESIMA QUINTA.

POTENTILLA NITIDA. *Linn. syst. pag.* 351. *Scop. it. tyr. p.* 52.
Heptaphyllum argenteum alpinum cutholiacum sabaudum. *Bocc. mus. p.* 20. *t.* 9.
Trifolium alpinum argenteum, persici flore. *Bauh. pin.* 328. *Pon. bald.* 222.
Comaroides alpina argentea sericea, persici flore. *Seg. ver.* 1. *p.* 497.

Julio copiosissime florentem in Carinthiæ alpe Villacensi inveni, ubi a casis pastoriciis descenditur versus Sanctum Spiritum. Item in elatissimis jugis Mittagskogl prope Malborgetto intra rupes & petras. Tum in summis alpibus Pontebanis Trögl; in editissimis Tyrolensibus alpibus Leontinis. Et alibi. Cespites amplissimi ex una eademque radice perenni oriuntur. Caules plurimi, erecti & semiprocumbentes, unum aut semialterum pollicem alti, teretes, una cum foliis & calyce tomentosi ex villo seu densa prostrataque pube albo-sericea & glaucescente. Folia radicalia plurima, semper præcise ternata. Foliola obovata, nonnunquam etiam oblongo-ovata, acutiuscula, subsessilia in apice petioli communis, plana, utrinque æqualiter sericeo-tomentosa, plerumque apice tridentata, denticulis antice incisis & conniventibus, persæpe tamen etiam per oram superiorem dentata, denticulis pluribus. Folia caulina inferiora radicalibus similia; petiolo basi stipulis binis ovato-acuminatis integris & ipsis tomentosis cincto. Superiora brevissime petiolata, ternata tamen cum petiolo stipulis breviore; foliolis una cum stipulis lanceolatis, integris. Folium supremum nonnunquam

dan-

simplex, ovato-acutum, sessile, integrum. Stipulae foliorum radicalium ovato-acuminatae, integrae. Videtur itaque Linnaeus stipulas confudisse cum foliolis, qui folia quinata huic Potentillae tribuit. Flos in caule quovis unicus, terminalis, magnus, speciosus; rarius enim sub apice flos alter accurrit. Calyx subcoriaceus, decemfidus; segmentis lanceolatis, alternis brevioribus angustioribusque, supra saltem saturate rubris, subtus semper colore & tomento foliorum. Petala quinque, subcordata propter emarginaturam non admodum magnam, colore florum persicae amoenissime rosea, ampla. Stamina plurima, calycina, saturate rubra. Antherae rubrae cum polline aureo. Receptaculum villosum. Germina copiosa, ovata, sessilia, rubra, sed villo albo sericeo nitente vestita. Stylus nudus, saturate ruber. Stigma simplex. Odor nullus. W.

TABULA VIGESIMA SEXTA.

PRIMULA GLUTINOSA

Auricula ursi septima. *Clus. hist. pag. 304.*

Auricula ursi octava. *Clus. cur. post. pag. 31.*

Auricula ursi montana, angustis, & leviter crenatis foliis, floribus purpureis, in horto Patavino collecta. *Pluk. alm. 62. t. 249. f. 6.*

Per plures jam annos plantulam hanc ex alpibus Tyrolensibus vivam accepi, etiam integros cespites, in quibus maxima cum primula minima, & copiosa crescebat, ut centena haberem specimina; sed quantumvis haec in principio vegetarent cultae, nulla plantula unquam floruit; nec floruit ulla. Iconem hinc ex Carinthia reverendus de Wulfen misit, & ad sylvestrem non minus convinentem, quae sequitur, descriptionem. Folia radicalia numerosa, plurima, lineari-lanceolata, obtusiuscula, serrata, nuda, fere pulposa, viscosa, olacea, minus tamen quam flores. Scapus pollicaris aut triplo altior, erectus, nudus, teretiusculus, e viridi tamen rufo-subcaerulescens, apice multiflora florum terminatus, primum albumine, ex floribus quinque, sex vel septem, subsessilibus & subsecundis. Involucrum universale, tubum corollarum aequans, fit ex foliolis quatuor, quinque vel sex, inaequalibus, oblongo-ovatis, obtusiusculis, subcoriaceis, integris, nudis, subringatis, fuliginosis, e viridi atropurpurascentibus. Calyx campanulatus, obovatus, subventricosus, rugosulus, tubo corollae brevior, subcoriaceus, extrorsum nudus, virens, quinquedentatus; laciniis integris, rotundatis. Corolla infundibuliformis; tubo cylindrico, albo; limbo quinquepartito, erecto-patente, saturate violaceo, segmentis obcordatis. Faux pervia, albida, & fere aquose luteola. Filamenta quinque, minima, alba, interne tubi parieti sub fauce inserta. Antherae oblongae, acutae, flavae. Germen globosum, glabrum. Stylus longitudine tubi corollae, albicans, sub stigmate subcaerulescens. Stigma capitatum, dilute subluteolum. Capsula globosa, unilocularis, polysperma. Odor floris & foliorum amoenus, fere is, qui in orchide conopsea aut odoratissima est. Vulgo in alpibus vocatur Blauer Jochspeik, quasi dicas caeruleam spicam celticam. Maxima in copia mense Julio invenitur per alpes Carinthiacas, & Leonenas Tyrolenses. In Melbinger alpen districtus Gmündensis inter inferiorem & superiorem lacum, ac si studio seminata fuisset. In apricis gramineis alpium Falkartensium supra Klein Kirchaim paulo supra lacum. In alpibus Fladnizensibus auf den Leitersteig. In Tauero Nassfeldensi. In alpibus Spitalensibus bey den drey Gerachen Seen. In rupestribus Heseckeralpen auf den Reichenaueralpen. In Taureris versus statum Salisburgensem. Et alibi.

TABULA VIGESIMA SEPTIMA.

PRIMULA VILLOSA.

Primula *foliis ciliatis, dentatis; scapo paucifloro.* *Hall. hist. helv. num.* 613.
Auricula ursi tertia. *Clus. hist. pag.* 303.

Copiosissime in alpibus Reichenau Garten dictis; item in supremis rupibus alpium Falcrensium; in rupibus Leiersteig alpium Vindobonensium; in rupibus alpium Winterthal & Eisenhut; abunde etiam in alpibus Leontinis, ubi color saepe saturatius violaceus & fauces luteae sunt. Floret initio Julii, & vix ad finem usque mensis. Radix crassiuscula, saepe satis longa, inter rupes fortiter flexa, versus caput petiolis foliorum antiquorum semitobidis induta, radiculas albas agens. Folia radicalia rantum adsunt, in rosam copiosam effusa, oblongo-ovalia, in petiolum velut decurrentia planum, crassula, undique villosula, saturo graminis virore, obtusiuscula, oris anterioribus obtuse serratis. Scapus ab uno pollice ad dimidium spithamam altus, teres, villosulus, apice umbellifer. Involucri universalis foliola ovata, obtusa, erecta, parva, villosula, a tribus ad septem. Flores in umbella a duobus ad duodecim. Pedicelli plus minus longi, inaequales, teretes, villosuli, in individuis prolis saepe brevissimi. Calyx ovato-campanulatus, quinquefidus, villosulus; laciniis rotundatis, obtusis, aequalibus. Corolla elegans, infundibuliformis; tubo cylindrico, albo, tandem sub limbo caerulescente, subtilissime villosulo; limbo quinquepartito, erecto-patente, vulgariter dilute caeruleo, alias magis violaceo: fauce albo. Segmenta sunt obcordata. Stamina quinque, alba, brevissima, subulata. Antherae oblongae, acutae, flavae. Germen globosum. Stylus stamina attingens. Stigma capitatum. Odor suavissimus. Farina nulla est in tota planta. W.

TABULA VIGESIMA OCTAVA.

GENTIANA PUNCTATA. *Linn. syst. pag.* 199.
Gentiana *foliis ovato-lanceolatis, nervosis; floribus campaniformibus, fasciculatis, creberrime punctatis.* *Hall. hist. helv. num.* 639.
Gentiana maior pallido flore, punctis distincto. *Clus. hist. p.* 312.
Gentiana maior, flore punctato. *Bauh. pin.* 187.

Nec eadem est, nec eadem sede moratur cum Gentiana pannonica Jacquini, altiorum longe alpium incola. Exeunte Julio flores aperit, Augusto late florens. In Spitalensibus alpibus, postquam ultra base Nase versus Parnitraner See processeris, & prata declivia aprica, vulgo die Scallen attigeris. In Tauerco Mahiacensi in parte Austriaca, maxima in copia. In alpibus Reichenavie supra sacellum Laurentium, vulgo Garten. In alpibus Fladnitzensibus, ubi ex Eisenhut & Winterthal versus mapalia pastorum & ovium vaccarumque greges descenditur. In declivitatibus infra alpem Grünspital Styriae. In alpa Wexel & alibi. In multis cum Gentiana pannonica convenit; in sequentibus propriis diversa. Folia magis ovata, minus elongata, strictiora. Calyces humiliores, magis pelviformes. Dentes calycini multo angustiores, acutiores, minus foliacei. Corolla velut papyracea, subtilissima, coloris triste & pallidissime ex virore stramineo, punctis creberrimis minimis inordinate sparsis. Laciniae limbi plerumque septem, etiam octo, rarius tantum sex; ac semper breviores, minus latae, contiguae, rotundatae, obtusae, nullis in basi auriculis. Denique ventricositas corollarum absolutior & fere eadem per totam campanam. Caeterum est descriptio ejus sequens. Radix perennis, crassa, fusiformis, horizontaliter obliqua, unam duasve spithamas longa, simplex aut ramosa, caput versus novas foliorum caulisque futuri anni gemmas efformans, intus flava & insignis amaroris. Folia radicalia & caulina, qualia in pannonica cum exceptione indicata. Nervi paginae inferioris non quinque solum, verum etiam quandoque septem, & initio etiam ex caeruleo atri esse solent, donec aetate dilati virides & aequali fiant. Caulis ad duas fere usque spithamas assurgit, erectus, teres, alternatim tamen

per

per genicula velut anceps, ex communi foliorum oppositorum, ubi connascuntur, ora, per totum geniculum decurrente, ex quo humilis admodum carina protuberans enascitur. Solet in specie haec, floribus adhuc dum immaturis & clausis, caulis in superioribus totus esse ex cæruleo ater & nitens; sed cum tempore magis magisque virescit. Flores verticillati, in duobus aut tribus, rarissime quatuor verticillis, fere quadrifloris singulis, extimis plerumque magis multifloris. Bifloros etiam vidi, ut aptius tunc flores oppositi, quam verticillati dicantur. Bracteæ foliorum æmulæ, tam communes, quæ verticillos fulciunt, quam quæ nonnunquam proprio cuique flori subjectæ sunt. Flores singuli pedicello brevi & crassiusculo insident, suntque erecti, fere breviores quam in pannonica. Calyx campanulato-pelviformis, leviter hexagonus vel pentagonus, membranaceus, primum ex cælestino albens, tum ex albido sublutescens; limbo in dentes a quinque ad octo, inæquales, lanceolato-subulatos vel lineari-lanceolatos, ex cæruleo virescentes, diviso. Corolla magna; clausa dum est, extus ex nigro cærulescens; dein matura in pallidissime stramineum colorem abiens; utcunque cylindraceo-campaniformis, ventricosa, fauce tantillo contractior, papyracea tenuitatis, nitore carens, totaque undique extus & intus punctis obscure atropurpureis minutis inordinate sparsis variegata. Limbus a sex ad novemfidus; laciniis contiguis, ovato-rotundatis, obtusis, integerrimis. Stamina a sex ad novem, ex candido albida. Antheræ longæ, flavæ, circa germen in cylindrum aut potius pyramidem leviter cohærentes. Germen basi gibbos a quinque ad septem prostantes possidet, inde triangulatum aliquatenus, donec oblongo-ellipsoideum cum longiusculo collo, styli vices agente, reddatur, læve, virescens, linea longitudinali, punctisque ex cæruleo purpureis variegatum. Stigmata duo, orbiculata, divaricata, deorsum incurva. Capsula unilocularis, bivalvis, polysperma; seminibus lentiformibus, per oras parumper alatis. Odor nullus. W.

TABULA VIGESIMA NONA.

GENTIANA CAMPANULATA.

Gentiana alpina major, floribus flavis, punctis carentibus, campanulæ forma, ex Pyrenæis. *Bauh. pin.* 187.

Autorum, qui venustam hanc alpinam nostratum stirpem descripserit, novi neminem, præter Casparum Bauhinum, qui, loco citato, illius mentionem fecisse videtur, sed plantæ dumtaxat siccæ, ab alio lectæ, scilicet a Bursero, ut credidit Linnæus in Speciebus suis pag. 329, qui varietatem Gentianæ purpureæ credit; adeo ut Bursero minime potuit inventionis gloria. Crescit in alpe Carinthiæ, Gamsi dicta, in Reichenau, mense Julio florens. Radix perennis, qualis in punctata & pannonica, extus flava, amarissima, fusiformis, teres, oblique horizontaliter descendens, in ramos divisa; annis singulis novos, caput versus, foliorum gemmas formans, &c. Folia tam radicalia quam caulina, quin & bracteæ verticillorum, ad pannonicæ formam accedunt, tota mollia, crassiuscula, ex glabritie velut unctuosa, ovato-lanceolata, in acumen longius, quam in punctata, excurrentia. Nervi foliorum in pagina inferiore extantes quinque vel septem. Caulis lævis, farctus, ex atrocæruleo tandem viridis, erectus, ad spithamas duas adscendens, teres, alterne tamen per singula genicula nonnihil anceps. Verticilli florum bini vel tres. Flores fere sessiles, in quavis axilla ab uno ad tres, extimo verticillo de more pluribus floribus onusto. Calyx humilem & pelviformem refert campanulam subheptagonam, membranaceam, albidam, cælestino cæruleo versus angulos translucente; limbo hiante & septemfido; denticulis brevibus, lanceolatis, obtusis, integris, planis, viridibus, foliaceis. Corolla magna, sulphurea (coloris gummi guttæ,) tota nitens quasi lævigata foret, striata longitudinaliter, externum immaculata, nullis punctis variegata, campanulata, basin versus fere ventricosior ac velut sphæroidea, inde cylindracea; limbo septemfido; segmentis æqualibus, erectis, contiguis, ob-

 ob-

rase triangularibus, integerrimis. Stamina ex corollæ interno pariete enata, similia Gentianæ punctatæ; filamentis albo subluteſcentibus, antheris flavis longisque. Germen etiam simile, lineis quidem longitudinali utrinque atroceruleo pictis, nullis tamen paullo variegatum. Stigmata & capsula ut in eadem. Odor etiam nullus. W.

TABULA TRIGESIMA.

ANTHEMIS ALPINA. *Linn. syst. pag.* 565.
Chamæmelum alpinum saxatile perenne, flore albo singulari, calyce nigricante, Michelii. *Till. hort. pis.* 38. *tab.* 19. *f.* 1. *Seg. ver.* 3. *p.* 282.

Radix lignescens, composita, fibroso-ramosa, multos caules effert spithamæos, ex viridi rubentes, striatos, erectos, villosos, unifloros, (semel bifloram inveni). Folia sunt subbipinnata. Radicalia copiosa, pinnata; pinnis linearibus, angustis, superioribus pinnato-dentatis; denticulis ipsis etiam linearibus. Caulina alterna cum pinnis nonnullis bifidis trifidisve. Cæterum sunt omnia læte virentia, nonnunquam prorsus nuda, alias villosula. Flos magnus, terminalis. Calyx hemisphæricus; squamis imbricatis aliquot ordinum, ovato-lanceolatis, obtusis, virentibus cum oris nigris, subvillosis vel nullis. Receptaculum conicum, paleaceum, paleis planis obtusis & per oras nigris. Corollæ radius femineus ligulatus; ligulis oblongo-obovatis, albis, striatis, planis, apice obtuse tridentatis. Corollulæ disci tubulosæ, quinquedentatæ, albæ. Antheræ flavæ. Semina pappo carent. Odor nullus. Crescit abunde in montibus & alpibus prope Leontium. Floret Julio & Augusto. W.

TABULA TRIGESIMA PRIMA.

SAXIFRAGA ASPERA. *Linn. syst. pag.* 304. *Ger. gallopr. p.* 423.
Saxifraga sedi foliis crenatis asperis. *Scheuchz. it.* 2. *p.* 140. *t.* 20. *f.* 3.
Sedum alpinum foliis crenatis asperis. *Bauh. prodr.* 132. *pin* 284. *Gem. pag.* 22 *num.* 27.* *tab.* 6.
Sedum alpinum, hispidum, fere spinosum, flore pallido. *Bauh. hist.* 3. *p.* 695. *Moris. hist.* 3. *p.* 479. *s.* 12. *t.* 10. *f.* 25.

Cæspites persæpe magni, densi, terræ musciquo magnam partem libere induunt, de rupestribus asperis humidis umbrosisque locis pendulis, ac sarmentis longis repentes. Sarmenta dico stolones liberos, prostratos, terræ iterum plerumque per intervalla irradicatos, rubros, leviusculos, tenues, teretes, lentos, non tamen absque ruptilitate quadam. Sparsæ per hæc sarmenta occurrunt in majore aut minore copia rosulæ subglobosæ foliorum & sessiles, veluti totidem capitula exigui cujusdam cardui; foliis imbricato-ovato-acuminatis, conniventibus, duriusculis, nudis, per oras subspinoso-ciliatis. Caules de centro annotinarum rosularum enati, simplices, tri-vel quadripollicares, basi procumbentes, inde erecti, teretes, graciles, primum pubentes, dein glabri, folioli, apicem versus ramuli sive racemosi; pedunculis a tribus ad quinque, unifloris, axillaribus ex bracteis subspinose ciliata. Folia caulina sessilia, lineari-lanceolata, plana, nuda, ex viridi lutescentia, per oras subspinoso-ciliata; ciliis albis, molliter rigidulis. Rosulæ subglobosæ foliorum, in axillis infimorum foliorum sessiles, propagines novas efficiunt. Flores ante explicationem globosi, nutantes. Calyx inferus, quinquepartitus; foliolis ovato-acutis, initio subvillosulis, corolla duplo brevioribus, per oras albidis, exterius dilute virentibus, cum aquose luteolis. Corolla alba, non nivea, concavo-patens, pentapetala; petalis rotundo-ovatis, integerrimis,

nis, basi interna notatis macula magna, pallide flava, quæ si prope aut per microscopium inspiciatur, congeries est punctulorum multorum flavescentium. Stamina decem ex basi receptaculi sub germine orta, subulata, alba, calyce nec corolla longiora, alternis paulo brevioribus. Antheræ aurantiacæ. Germen in fundo calycis sessile, ovato-acuminatum, apice bifidum, nudum. Styli vix ulli præter acumina bina conniventia. Stigmata simplicia, obtusiuscula. Capsula erecta, oblonga, bilocularis, birostris, rostris divaricatis, polysperma. Odor nullus. Crescit locis asperis rupestribus umbrosis & fere silvaticis, ubi aquæ per saxa largius destillant. In sylva, quotquot ad castellum & fanum sancti Josephi in Pladnia veniatur. Tum in valle rupestri, per quam torrens Nassfeldensis iteratis saltibus sese præcipitat trans Taurerum Malnitzensem. Item in alpibus Spitalensibus, Reichenavicensibus &c. W.

TABULA TRIGESIMA SECUNDA.

FRITILLARIA MELEAGRIS. *Linn. syst. pag. 241. Syst. veg. ... 1. p. 241.*
Fritillaria caule pauciflato; foliis caulinis gramineis, alternis. *Hall. hist. helv. num. 1235.*
Fritillaria. *Clus. hist. pag. 152.*
Meleagris. *Rondel. spec. pag. 147.*

Labaci in Carniolia, maxima in copia, a medio Martii usque ad medium vel finem Aprilis; in sylva urbica (Stadtwald), & in palustribus secus flumen Labacum, idque usque Hyperlaacum vidi. Bulbus radicis, majoris avellanæ magnitudine, solidus, albus, subglobosus, gibbus, velut e pluribus constans; nec squamosus, ut in liliis; nec tunicatus, ut in aliis; verum tectus thecæ sphæricæ, carnosæ, subpulposæ, obsolete albidæ, ex cujus basi capillitium fibrarum aut radicularum descendit. Caulis spithama altior, teres, tectus, levis, ex viridi rubescens, & nonnunquam etiam maculis, aut punctis roseo-fuscis, variegatus. Folia quinque vel sex, caulina duntaxat, ea alterna, sessilia, basi supra canaliculata, ac velut caulem amplexantia, & vaginantia, cæterum lineari-lanceolata, crispo-ficantia, levia, ex viridi subglaucescentia. Flos in caule unicus, (nec plures inter centenos vidi,) terminalis, pendulus, primum obverse pyriformis aut potius ovato-pyramidatus, tum campanulatus. Calyx nullus. Corolla magna; petala sex, æqualia, lanceolato-ovata, integerrima; alternis interioribus. Sunt autem speciosissime variegata ex sericeis maculis subquadratis, alternatim rubris albidisque sive aquose luteolis, apice ex virore flavescente & calescente. Nam istic in petalorum fundo speciosam illam Coronæ imperialis hemisphæricam & lacrymantem quæras foveam; adest character generis, sed obscurior, in canalem lanceolatum ad unam tertiam petali supra basin internam excavatus, sordide lutescens, & madens, per oras ater; & huic in externa petalorum pagina respondens gibbus flavescens. Stamina sex, petalis humiliora; filamentis subulatis, albidis, ultra germen elatis. Antheræ oblongæ, quadrangulæ, polline flavo, apice virescente instructæ. Germen erectum, luteo-virens, trigono-prismaticum. Stylus erectus, in stigmata tria æqualia divergentia profunde divisus, quæ in superficie secundum totam longitudinem sulco tenui sunt canaliculata. Odor nullus. W.

TABULA TRIGESIMA TERTIA.

ACHILLÆA MOSCHATA.
Achillæa foliis pinnatis; pinnis simplicibus, glabris, punctatis. *Hall. hist. helv. num. 112.*
Iva moschata. *Gesn. epist. 66.*
Tanacetum alpinum. *Bauh. pin. 132.*

Radix ſubligneſcens & ſola ipſa jam teres ceſpitoſe ramifera. Caules erecti & inermes, multi ex eadem radice, vix dimidiam ſpithamam excedentes, modo glabri, modo tomentoſuli, apice elegantem florum umbellam ſuſtinent. Folia tam radicalia quam caulina pinnata, plerumque glabra; ſed eorum tomentoſula, præſertim in prima ætate; nonnihil pulpoſa, microſcopio etiam porulosa. Pinnæ lineares, anguſtæ, planæ, acutæ, ſimplices, radicalium tamen foliorum nonnullæ bi- vel trifidæ cum laciniis acutis & linearibus. Folia caulina ſuperiora ſeſſilia, lanceolata, pinnatifide incisa, acuta. Umbella florum terminalis, floribus pedunculatis. Calyx obtuſigo-ovatus; ſquamis plurimis ordinum imbricatis, oblongo-ſubovatis, obtuſiuſculis, medio viridibus, per oras fuſcis aut nigris, ſubaumentoſis. In corollæ radio a quinque ad octo locantur femineæ ligulatæ, albæ, ſtriatæ, obovatæ, obtuſiſſimæ trifidæ, patentes. Corollulæ diſci tubuloſæ, quinquedentatæ, æquales, albæ. Columna antherarum flava. Receptaculum anguſte conicum, paleaceum; palea lanceolatis, apice ſubdentatis, planis. Semina nuda, obverſe tetragono-pyramidalia, pappo nullo. Planta tota aromatica uberrima. Capitula in altiſſimis Leontinis alpibus occurrit. Floret Julio & Auguſto. W.

TABULA TRIGESIMA QUARTA.

ARTEMISIA SPICATA.

Artemiſia foliis ſericeis; radicalibus petiolatis, pinnatis, inciſis; caulinis ſemipinnatis. *Hall. hiſt. helv. num. 127.*

Abſinthium alpinum ſpicatum; foliis petiolatis, bis trifidis; caulinis pinnatis. *Allion. ped. 1. p. 3. t. 1. f. 2.*

Abſinthium pumilum palmatum minus, argenteo ſericoque folio. *Barr. muſ. 2. p. 1. pag. 81. tab. 71. Burr. rar. tab. 462.*

Ab Artemiſia rupeſtri, quacum Linnæus tanquam varietatem confundit, diverſiſſima planta. Radix lignoſcens, fuſiformis, fibras funiculorum inſtar emittit. Flores a capite educit caules, vix ſpithamæ altitudine. Hi baſi nonnunquam procumbunt, inde erecti, tereticuſculi, una cum foliis & calycibus tamento ſericeo brevi & ex viridi cinereſcente obtecti. Folia radicalia multa, longe petiolata, bipinnata: laciniis ſeu lobis planis, oblongis, obtuſis. Caulina ſeſſilia, lanceolata, pinnatifide inciſa, laciniis linearibus. Flores in ſpicam longam & fere compactam, maxime apicem verſus, diſpoſiti, axillares, ſubſeſſiles, alterni, lateralii. Calyx ovatus, ſquamis ordinum aliquot imbricatis, connitentibus, ovato-lanceolatis, e viridi obſcure cinereis, per oras fuſcas vel nigris. Receptaculum nudum. Floſculi flavi, plerique hermaphroditæ, atque hi corollulis tubuloſo-quinquefidis. Femmei nonnulli in circumferentia tenuiſſimi, fulo tubo absque limbo denato conſtantes. Antheræ & ſtyli flavent. Semina inverſe pyramidata, nuda, ſine pappo. Odor plantæ gratus, aromaticus, potens. Creſcit in ſuperioris rupibus alpium Leontinarum, florens Julio & Auguſto. W.

TABULA TRIGESIMA QUINTA.

ARTEMISIA GLACIALIS. *Linn. ſyſt. pag. 542.*

Apſinthium ex alis floridum; foliis anguſtis, ſericeis, pinnatis; pinnis trifidis & quinquefidis. *Hall. hiſt. helv. num. 126.*

Apſinthium foliis ſericeis, petiolatis, pinnatis; pinnulis trifidis & quinquefidis. *Hall. hiſt. helv. num. 125.*

Ab-

Absinthium alpinum incanum. *Bauh. prodr. 71. pin. 139.*
Absinthium alpinum candidum humile. *Bauh. pin. 139. Allion. ped. p. 5. t. 1. f. 3.*
Absinthium sericeum montanum candidum. *Scheuchz. it. alp. 1. p. 29. t. 3. f. 1.*

Citatam apud modo nominatos omnes auctores plantam pro una eademque specie habeo: ubi monere tamen oportet, clarissimos Mygindium & Jacquinum, quibuscum super illa multum denique disserui, cum Hallero eamdem sentire, & distinguere Halleri Absinthium num. 126., quod pro mea habent, ab ejusdem Absinthio num. 125., quod esset, (nec mea) Artemisia glacialis Linnæi. Crescit copiose & floret Julio & Augusto in summitate Koralpen; in Reichenau inter fontem Laurentium & alpes Fladnizenses; item abunde in alpibus Lavantinis. Radix fusiformis, radiculis brevissimis longiusculis instructa, equidem non admodum crassa, imo nonnunquam fat gracilis; ex capite tamen in plurimas persæpe divisa caules laxum cæspitem efficit. Folia radicalia quam plurima, longe petiolata, petiolo basi vaginante; apicem versus subbipinnata, seu pinnata, pinnis una parte a duobus ad quatuor communiter, pinnis palmato-multifidis, profunde incisis, laciniis linearibus, angustis. Folia caulina alterna, remota, longe petiolata, petiolo planiusculo, apice pinnata in inferioribus, in superioribus vero palmata, laciniis linearibus angustisque. Caulis teretiusculus, ex semiprocumbente basi adscendens, spithamæus. Folia, caulis, & calyx, sericeo-tomentosi, tomento in novella planta ex viridi cano, in adulta autem albo. Flores in quibusdam caulibus nulli, nisi in vertice tres quatuorve contigui & subsessiles; in plerisque solitarii, folitarii, pedunculati, ab invicem remoti, erecti, majusculi, subglobosi. Pedunculus folio succedente brevior. Calyx squamis dictarum undique imbricatus quidem, sed inæqualibus; hæc vix imbricatio detegitur nisi squamæ separentur cultello. Squamæ ipsæ lineari-lanceolatæ, interius concavæ, sed & dorso longitudinaliter convexa, margine toto ex rufo fuscescente, quamvis propter tomentum sub apice cinerea videantur. Receptaculum villosum villis candidis. Flosculi calyce parumper longiores, citrini, pleriqui hermaphroditæ, tubulosi, quinquedenticulati, pauciores in ambitu feminei angustiores tubulosi. Styli & stamina de more generis. Semina parva, oblonga, turbinata, & fere inverse pyramidata, nuda. Odor plantæ aromaticus, gratus, potens. W.

TABULA TRIGESIMA SEXTA.

CROCUS VERNUS. *Linn. syst. p. 75. Scop. carn. 1. p. 39.*
Crocus tuba brevissime trifida. *Hall. hist. helv. num. 1257.*
Crocum vernum latifolium cum varietatibus suis. *Clus. hist. p. 203. & aliorum autorum.*

Circa Goritiam undique maxima in copia, jam Februario floret, coloris vulgo nivei aut violacei, nonnunquam ex rubro violacei. Solet etiam varietas alba extus, ubi tubus corollæ ad faucem dilatatur, plus minus, saltem per strias, cærulescere. Circa Labacum in Carniolia copiose Martio & Aprili. In Carinthia prope Clagenfurtum in fine Martii & Aprili in summitate montis Radsberg copiose flore albo cæruleo. Item in monte Sancti Udalrici supra silvas, ubi prata alpina incipiunt, copiosissimus. Circa Maria Flende. Circa Gurk pertrequens, vulgo violaceus &c. Linnæus cum sativo autumnali confundit; ego semper pro diversa habebo specie. Alter præcise autumnalis; hic vernus duntaxat. Hujus stigma infundibuliforme, trifidum, laciniis brevissimis, obovatis, planis, dentatis, saturum. Illius aromaticum; laciniis rubris, longis, &c. Iste sativus, non autem ille. Sed & in bulbis diversus, ut conferenti figuram nostram cum Dodonæana clarum est: nam in sativo bulbus superior multo major est inferiore, ubi contrarium in verno obtinet. Vide figuram croci sativi autumnalis florentis apud Matthiolum. Croco verno pro radice est bulbus velut

duplicatus, majoris avellanae magnitudine, solidus, albus, subsphaeroideus, inferiore duplo majore, involutus extus thecis squamaeformibus, fusco-argillaceis, basi capillitio cujusdam radicularum fibrosarum coloris pariter fusco-argillacei. Ex centro aut apice potius pulvilli bulbi superioris scapus erigitur fere pollicaris, albus, triqueter, solidus, cui corolla, & in fundo corollae germen insidet. Corolla longissima, bipollicaris; tubo longo, tereti, fauces versus latescente; limbo sexpartito, primum erecto, tandem erecto-patente; segmentis aequalibus, oblongo-ovalibus, integris, ternis, alterne interioribus. Stamina tria, insidentia alternis segmentis corollae; filamentis albis; antheris elongato-sagittatis, aurantiacis. Germen in fundo tubi corollae, oblongum, obtuse triquetro-ellipsoidicum; stylo longissimo, corollam aequante, albo, sub stigmate flammeo-aurantiaco. Stigma infundibuliforme, tripartitum; segmentis planis, brevibus, obovatis, serratis, flammeo-aurantiacis. Pericarpium oblongum, ellipsoidicum, obtuse trigonum, triloculare. Semina multa, ovata. Folia tantum radicalia, a duobus ad quatuor, floris altitudine aut longiora, graminea, angusta, nuda, integra, laete viridia, supra canaliculata lineaque nivea secundum totam longitudinem picta, subtus carinata, carina extante plana. Apprime haec flori solent spathis vaginantibus, obtusis albentibus, ternis, quandoque quaternis; ut nesciam, cur Linnaeus dixerit *spatham unicam radicalem*? Odor nullus. W.

TABULA TRIGESIMA SEPTIMA.

SCANDIX ODORATA. *Linn. syst. pag.* 213.
Myrrhis odorata. *Scop. carn.* 1. *pag.* 207.
Myrrhis foliis triplicato-pinnatis, mollibus; seminibus sulcatis, maximis. *Hall. hist. helv. num.* 753.
Myrrhis major, Cicutaria odorata. *Bauh. pin.* 160.
Odorata. *Riv. pent. tab.* 56.

Crescit in alpibus Carnioliae & vicinarum provinciarum. Radix perennis, saepe difformis & maxima, tunc ex variis locis multicaulis, dulcis, aromatica, & odore pollens, uti tota planta, in qua aliquid de Cerefolio & Anisi esse videtur. Caulis bipedalis, fistulosus, lineato-striatus, villosulus, patenti ramosus. Folia sunt multiplicato-pinnata, ampla, mollia, subtus ad lentem sericeo-villosula, plana, circumscriptione triangularia; costa tereti, ad basin vaginante & striata; pinnulis ultimis ovatis vel oblongis, inciso-serratis, inque foliolum longe lanceolatum acutumque subconfluentibus. Umbella universalis planiuscula componitur ex radiis circiter quindenis, involucro destituta. Partialis est similis, sed involucro gaudet pentaphyllo ex foliolis lanceolatis, setaceo-acuminatis, pallidis, patentissimis, longitudine umbellulae. Flosculi plerique sunt mares; pauci hermaphroditi & fertiles in centro. Petala inflexo-cordata, patentissima, alba, extima umbellularum majora. Radii in fructu eriguntur omnes. Semina linearia, longa, fusca, nitida, acuminata, hinc plana, illinc acute pentagona & quinquesulcata. Floret Junio. Culta in horto jam Majo. In tabula sistuntur pars caulis superior; pars radicis, quae in culta saepe caput humanum aequat; umbella fructifera, nedum matura; involucrum partiale; & semen idemque transverse dissectum; omnia in naturali magnitudine.

TABULA TRIGESIMA OCTAVA.

ANTHERICUM SEROTINUM. *Linn. syst. pag.* 244.
Phalangium foliis crassulis, scapo unifloro. *Hall. hist. helv. num.* 1209

Bul-

Bulbocodium alpinum, juncifolium; flore unico, intus albo, extus squalide rubente. *Ray. syn. 3. pag. 374. tab. 17. fig. 2.*

Pseudonarcissus gramineo folio, seu Leuconarcissus æstivus. *Bauh prodr. p. 27. Rudb. elys. p. 64. Bauh. pin. 51.*

Narcissus serotinus montanus. *Clus. pann. pag. 176.*

Non nisi supremis altissimarum alpium locis fovet aprica, graminosa, dura, rupestria; nempe in summis jugis Falkert, Leiterlteig, Winterthal, Eisenhut, Mitergskogel, Trögel; tum in summitate alpium Ortenburgensium, Spitalensium, Taureri Malnizensis, Leontinarum, &c. Bulbus solidus, ovatus, albus; thecis nonnullis instar perichætii involutus, ad folia, opinor, scapo approximata retinendo, nam verae squamae adsunt nullae. Forsan & hae thecae, aut si mavis indumenta, reliquiae duntaxat sunt foliorum praeteritorum annorum. Basis bulbi inferne in parcum radicularum capillitium abit. Odor illi nullus. Folia radicalia caulem persaepe superantia, primum triquetra, tum subcylindracea, denique planiuscula, semper crassiuscula, admodum angusta, linearia, graminea, acuta, levissima, nitentia, & velut setacea, saturo graminis virore. Caulis vix dimidiam attingens spithamam, erectus, teres, levis, apice uniflorus; foliis alternis tribus quatuorve sessilibus amplexicaulibus, lanceolatis, oris velut convolutis. Flos respective magnus. Calyx nullus. Corolla hexapetala; petalis oblongo-ovatis, integerrimis, erecto-patentibus, alternis interioribus, subaequalibus; ungue seu basi potius ipsa foveola, fovea nectarifera paulo supra basin internam fulciatur velut tuberculo extante horizontali flavo ex tribus minoribus constante. Caeterum petala sunt intus alba, striis tribus impressis rubellis picta, extus ex albo pallide & aquose rubella cum lineis tribus saturatioribus & extantibus peraratae. Stamina sex aequalia, petalis breviora, subulata, alba; antheris subrotundis, luteis. Germen columnare, triquetro-prismaticum. Stylus & ipse triquetrus, crassiusculus, a germine manifeste distinctus. Stigma truncatum. W.

TABULA TRIGESIMA NONA.

PÆDEROTA BONAROTA. *Linn. syst. edit. 13. pag. 58.*

Paederota caerulea. *Scop. carn. 2. pag. 41.*

Bonarota montana, italica, chamaedryos folio, flore caeruleo. *Mich. gen. pag. 19. tab. 15. fig. 1.*

Bonarota montana, italica, chamaedryos folio rotundiore & quasi crenato, spica caerulea hispidiore. *Mich. gen. pag. 19. tab. 15. fig. 2.*

Chamaedrys montis Summani. *Bauh. hist. 3. pag. 289.*

Floret abunde Junio Julioque Malborgeti in rupibus; tum in summitatibus apricis alpium Pontebanis, Troeg aut Trigel dictis, ubi folia saepe ovato-acuta esse solent, & vel supra etiam villosa, minus firma, neque nitentia, sed & color ibi corollae caeruleus multo magis dilutus, nonnunquam etiam albus. Denique in rupibus circa Leontium abunde. Et haec caespitose crescere solet. Radix intra rupium rimas arcte haeret, caules floriferos & alios steriles efferens. Caules aut simplices, aut basi ramosi, ramis duobus tribusve, erecti, lignescentes, spithamales, caeterum sat graciles, firmi, teretes, ex viridi rufescentes, villosuli. Folia constant opposita; inferiora minora, sessilia, rotunda; superiora oblonga, aut ovato-oblonga, aut etiam rotundata, sessilia aut subsessilia, semper sat firma, crassiuscula, dentata magis quam serrata, saturo viridia, supra glaberrima & nitentia, subtus villosa villis extantibus & sese demum magnam partem perdentibus; summa lineari-lanceolata & integra. Spica terminalis, initio sat compacta, sed tandem laxa. Bracteae lineares, villosae, flores aequantes, eandem rufae. Flores axillares in bracteis, pedunculati. Calyx quinque-

parcitus; laciniis linearibus, rufis, villosiſc, æquabilus. Flos elegantor violaceus. Tubus albus. Labium ſuperius longius, apicem versus latescens, æqualiter tridentatum. Labium inferius nonnihil brevius, ovato-acutum, plerumque integrum, & deorſum pendens. Stamina duo, violacea. Antheræ cordatæ, exſeltino-carulcæ. Stylus aleur ſtaminibus, violaceus. Stigma ſubcapitatum, albidum. Reliqua, ut in Federata Agetia Linnæi. Odor nullus. W.

TABULA QUADRAGESIMA.

SEMPERVIVUM GLOBIFERUM. *Linn. ſyſt. pag.* 335.

Sedum roſulis hirſutis, ciliatis; petalis ſubulato-lanceolatis, duodenis. *Haſl. hiſt. helvet.* 950

Sedum minus vulgari ſimile, globulis decidentibus. *Moris. hiſt.* 3. *p.* 472. *ſ.* 12. *t.* 7. *f.* 18.

Sedum vulgari magno ſimile. *Raiſ. hiſt.* 3. *p.* 688.

Radix fuſiformis, rugoſa, ex albo ſubargilbcea, ramos agens, multiceps. Roſæ foliorum radicales, aliæ in radicis capitibus ſeſſiles, aliæ pedunculatæ velati a longis procumbentibus aut ſub terra proreptentibus flagellis, libcris, teretiuſque radicatis. Sedliformes hæ roſæ ſunt propagines annuæ, e foliis radicalibus imbricatæ, primum globoſæ ſive ovatæ foliis conniventibus; in paruciſſimas denique explicatæ roſas, inceſcentibus & a ☒ invicem diſcedentibus foliis. Folia ovato-acuminata, ſupra concava; ſenſim oblonga; denique fere lanceolata. Supra plana, ſubtus convexa, undique glabra, lævia, ſuccoſa, carnoſa, ex viridi glaucescentia, baſin verſus rubentia, integra, oris ciliata ciliis albis, rigidiuſculis, remotiuſculis. Caulis ſpithamæ altitudine, a centro vetuſtæ anni prioris roſæ, erectus, villoſus, teres, farctus, ſuccoſus, albido-virens, ac ☒ virore aquoſiſſime ſubrutescens; foliis undique ſparſis, ovato-lanceolatis, ſeſſilibus, integris, ſupra planiuſculis, ſubtus convexis & villoſis, apicibus rubentibus, ſuccu turgidis, denique deciduis Caulis apice ☒ cymam one corymbum refirm quatuor aut quinque brachiorum abit, quæ ſunt ſubæqualia, erecto-patentia, inde obverſe arcuata, divergentia, villoſa, ſuperne flores ſeſſiles ſecundos in eadem ſerie longitudinali racemoſe ſuſtinentes. Flores magni pedunculo parvo craſſiuſculo villoſo inſidentes in axilla bractcolæ villoſæ nec calycem excedentis. Hic hemiſphæricus, monopbyllus, ☒ tota planta, ſuccoſus, villoſus, ☒ laciniis lineares, æquales, numero duodecim, ſedecim, octodecim imo & viginti, profunde ſecatur. Petala a duodecim ad octodecim, lineari-lanceolata, integra, calycem triplo excedentia, flava, patentiſſima, fulcus villoſa, per oras villoſo-ciliata, baſi ſubrubentia levicrque cultzcentia. Stamina petalorum bafi inſixa, bina perſæpe una in petalo, calyce longiora, ſed petalis duplo breviora; filamentis ſubulatis, facure rubris, ☒ baſi pubescentibus; antheris aureis. Germina tot, quot petala, oblongo-ovalia, in ſtylum acuminata, initio conniventia & villoſula; cum divergentia in cicculum, dorſo longitudinaliter convexo, lateribus ſurſum verſis compreſſis, ſulco longitudinem ſuperam exeantes, ac demum dehiſcente. Stigmata capitata, umbilicata, papillofa, alba. Siliquæ capſulares, unilocularcs, bivalves, polyſpermæ, maximam partem glabræ. Odor nullus. Creſcit & florct Julio & Auguſto perquam copioſe in rupeſtribus alpium Fladnizenſium, Wetterthal, Eiſenhue, Reichenavienſium & Leontinorum. W.

TABULA QUADRAGESIMA PRIMA.

SEMPERVIVUM MONTANUM. *Linn. ſyſt. pag.* 335

Se-

Sedum rofulis ſemipartitis, hirſutis; petalis novenis, ſubbirſutis. *Hall. hiſt. helv. num. 951.*
Sedum minus, flore rubente. *Bot cyſt. cent. II. 6. fol. 8. fig. 2.*
Sedum montanum umbilicatum minus, flore ſaturè purpureo. *Barr. ic. 374.*
Sedum alpinum rubro magno flore. *Bauh. pin. 284.*
Sedum majus montanum; foliis non denticulis; floribus rubentibus. *Bauh. pin. 283.*
Cotyledon altera tertia *Cluſ. hiſt. pag. LXII.*

Creſcit in ſiſdem fere cum Sempervivo arachnoideo locis; in alpibus Milleſtadienſibus, Vollart, Koralpen, Gmunde, Deblingeralpen, Obervellach, Thurero Maloiſzenſi, in alpibus Schteinitzenſibus & Magenwaldenſibus, &c. Propagines globoſæ, tum patentiſſimæ; foliis villoſulis, intùs velut ovatis, tandem lineari-lanceolatis, viridibus, apice rubris, dorſo convexis. Caulis dimidia ſpithama plerumque paulo altior, villoſus, ut viridi tandem totus una cum foliis ruber. Folia ſemper villoſa, ſeſſilia, dorſo convexa, ſemicylindracea, acuminata, alias viridia cum apicibus rubris, alias tota rubra. Cyma florum terminalis, trifida. Brachia cymæ patentiſſima & arcuata. Flores racematim ſubſpicati ſubpedunculati. Calyx in duodecim & ultra dentes ſemiſectus, apicibus rubris. Petala pallidiſſime roſea, patentiſſima, lineari-lanceolata, villoſa, a duodecim ad viginti quatuor. Filamenta plus quam viginti ſunt, ſtatura rubra, petalis breviora. Antheræ flavæ, aurantiacæ. Germina numero petalorum. Differt ab arachnoideo plurimum petalis anguſtis, longis, villoſis, conſtanter alibi coloratis; cum defectu telæ arcnaceæ. Vidi hæc in ſpecie ſæpe cyanum florum acquirens, in centro roſulæ ſeſſilem. W.

TABULA QUADRAGESIMA SECUNDA.

SEMPERVIVUM ARACHNOIDEUM. *Linn. ſyſt. pag. 335.*
Sempervivum rubrum, montanum, gnaphaloides. *Cl. exper. I. pag. 292. t. 291.*
Sedum petalis novenis, comitalis; roſulis araneoſis, calveſcentibus. *Hall. hiſt. helv. num. 952.*
Sedum montanum roſeum minus reticulatum *Barr. ic. 393.*
Sedum montanum tomentoſum. *Bauh. pin. 284.*

Circa Milleſtadium in rupibus ubivis. Maleſtæ omnes ſepes muricite abundant hac planta. Prope Gmund in alpe Deblingenſi. Obervellaci verſus Malnitz. In alpibus Leontinis, Reichenau, &c. Cæſpites integri propaginum globoſarum foliculis tectis, imi eidemque radici cohærent. Propagines imitio globoſæ ſunt, & lilas araneaceas obſidere albentibus obſitæ, quibus apices ſuliorum cohærebant. Folia ipſa in principio videntur ovata; tum cum tempore oblonga magis fiunt & velut ſemicylindracea, dorſo convexa, ſupra planiuſcula, plus minusve virentia cum apicibus rubris primumque undique villoſis, dein glabriuſculis. Primi folia propaginum a ſeſe magis diſcedunt, ac ſe in roſam ſediformem expandunt, ut etiam hæ araneæ magis diducantur, & reticulum araneæum efformant. E contra roſæ præteriti anni, & jam emarcidæ, caulis exſurgit, plerumque vix dimidiæ ſpithamæ, villoſus, foliis undique ſparſis veſtitus; quæ ſunt ſublanceolata, ſeſſilia, dorſo convexa, carnoſa, ſucco plena, villoſa, apice ac denique tota rubra, quum intùs viridia fuerunt. Caulis apice in cymam, plerumque trifidam, abit; flore centrali ſubpedunculato. Brachia cymæ de more divergunt arcuatim, & flores racematim ſubſpicatos poſſident elegantiſſimos. Bracteolæ rotiis cum proparoubus æmulæ. Calyx carnoſus, villoſus & lucci plenus, in dentes novem, decem vel duodecim ſemiſectus, apice rubentes. Petala octo, novem aut decem, etiam ſæpe duodecim numerevi, ovato-lanceolata, elegantiſſime roſea, linea ſæturaliore medium longitudinem percurrente. Stamina petalis duplo pluta, rubra, cum atropurpurea. Antheræ flavæ. Germina petalorum numerum ſequuntur; ſtylis rubris, in coronam magis

magisque divergentibus. Reliqua, ut in congeneribus. Villi propter exiguitatem in foliis non fuerunt expressi W.

TABULA QUADRAGESIMA TERTIA.

HIERACIUM INTYBACEUM.

Hieracium foliis oblongis, asperis, lanceolatis, dentatis; calyce hirsutissimo. *Hall. hist. helv. num.* 41.

Hieracium intybaceum, flore magno albido. *Bauh. prodr. pag.* 65. *Scheuchz. it.* 4. *pag.* 336.

Radix brevis, crassiuscula, obliquè horizontalis, extus nigra, radicellis, fibrarum instar, perpendiculariter & capitate demissis, caudem attollit unius plus minus spithamæ, erectum, ab imo ad summum tres & rarius quatuor flores ferentem, villosum, una cum tota planta glutinosum. Villi caulis calycesque extantes, nigri, apice globoso glutinosi, capitelli instar, ornati. Folia sparsa, oblonga, sessilia, subdenticulata, villosa, scabriuscula, mollia tamen, inordinate dentata, quæ oras crispato-undata; summis fere lanceolatis & integris. Pedunculus in planta unifera plerumque aphyllus; sed duos plures flores affert, cum etiam reliqui folioli, ramorum more monanthorum. Flores fat magni. Calyx compositus ex squamis rectis, æqualibus, pilosissimis, nigro-villosis; sessilis inter folia, quæ velut calycem exteriorem formant, longa ut calycem quandoque excedat, semiteretia, duo, fluitantia, minus nigra. Receptaculum nudum, punctatum. Corollulæ omnes æquales, ligulatæ, quinquedentatæ, coloris dilutissimi deaurati aut sulphurei. Cuticulæ antherarum, veli, & filamenta revoluta, ejusdem planè coloris. Pappus simplex, sessilis, pilosus, microscopio dumtaxat parce cilestus. Odor peculiaris nullus. Mensibus Julio & Augusto haud infrequentem inveni in alpibus Reichenavienſibus & Leontinis Morawskienſibus, &c. Descriptio & figura sunt a Rev. Wulfen. Ex Tyroli etiam specimina hæc a clar. Schrankio accepi.

TABULA QUADRAGESIMA QUARTA.

LASERPITIUM SILAIFOLIUM.

Clarissimo Bernstati notitiam hujus plantæ debeo, qui & semina, & specimina hæc ante aliquot annos dedit. Illa, serum demum maturis annis florentes, stirpes genuere; ex quibus depingi curavi superiorem caulis partem, a fructu pleniori vix differentem; cum radicem, florem auctum; semen in matura magnitudine, utrumque conspectum; quibusque auctis transversum sectionem. Quam vero addo descriptionem, a supra laudato viro est in sylvestria individua concinnata, quæ in collibus saxosis Carnioliæ, & in Monte generoso Italiæ, copiosa invenit. Radix perennis, intus & extus alba, hic tandem acute fusca, varius fibrillarum & perpendicularis, crebris transversis & ramosis, inæqualis, digitum æquans crassitie, fibris auctis, saporis subdulcis, odoris aromatici. Caulis in collibus apricis & saxosis perennis, unam alteramve lineam crassus, spithamam aliquando non superans altitudine; in declivi magisque ferili solo ad fructicem & margines sylvarum altitudinem quatuor pedum haud raro assequitur, calamique scripturi crassitiem. Ex una radice ab uno ad tres & ultra egrediuntur caules, erecti, striati, glabri, flexuosi, ramosi. Petioli membranacei caulem amplexantur, striati canaliculati. Folia multiplicato-pinnata, glabra; foliolis profunde incisis, planis; laciniis oblongis, brevior angustatis. Pedunculi oppositifolii, erecti, striati. Umbellæ densæ, planiusculæ, ex radiis numerosis. Umbellulæ similes. Involucri universalis foliola pauca, etiam unicum, linearia, rarius pinnatifida, umbella duplo breviora.

Per-

Particularis planta, linearis, umbellulæ longiradiatæ. Flores omnes hermaphroditi. Petala alba vel ex albo flavescentia, subæqualia, ab apicem inflexum ex oblongo cordata, erecto-patula. Germen striatum, oblongum, glabrum. Filamenta filiformia, petalis multo longiora. Antheræ pallidæ. Styli albi & erecti. Semina elliptica, glabra, hinc plana, illinc convexa, & alis quinque membranaceis munita.

TABULA QUADRAGESIMA QUINTA.

SENECIO DORONICUM. *Linn. syst. p. 552. Scop. carn. 2. p. 163.*

Senecio foliis ovatis, serratis; imis petiolatis, subrotundis; caulinis lanceolatis. *Hall. hist. helv. num. 65.*

Senecio corollis radiantibus; caule simplici, subunifloro; foliis undatis; radicalibus petiolatis, subtus incanis. *Ger. gallopr. pag. 196. tab. 7.*

Jacobæa integra & crassa literatii Iulio. *Seg. ver. 3. p. 278.*

Doronicum verum, Austriacum alterum. *Clus. hist. XI II.*

Doronicum folio longo serrato. *Raii. hist. 3. pars. 1. pag. 19.*

Doronicum radice dulci. *Bauh. pin. 184.*

Doronicum Helveticum incanum. V. Doronicum Helveticum humile crassis subtis. *Bauh. prodr. pag. 97.*

Jure merito multiformem plantam Hallerus vocat, si omnia hæc synonyma & insuper alia, ut vir celeberrimus, plurimarum autopsiæ, judicio, uni eidemque speciei hæc adscribenda. Hujus, quæ Carinthiaca est, tantum sequentemque descriptionem reverentibus Wulfen nuncupatam communicavi. Copiose crescit & floret Julio mense in alpibus Reichenavicensibus & Marmwaldensibus, &c. Radix obliqua horizontalis, tuberosa, e qualis recta descendentibus, colatis rufeo-argillaceis, caulem effert plus quam spithamæum, teretem, striatum, villosum, hirsutum, ab uno ad tres, raro quatuor vel quinque, flores gerentem. Folia omnia acute serrata, trina, ovata, supra saturate viridia, glabra, & nonnihil nitentia, subtus pallidiora & villosa; radicalia oblongo-ovata, in petiolum decrescentia; caulina lanceolata & plerumque sessilia. Flos pedunculatus, nonnihil nutans, aureus sive flavore aurantiacus. Calycis squamæ interiores, unius ordinis, lineares, apice eandem fasciæ rufescentes. Exteriores latiores, tere calycinum locum occupantium formantes, paulo interioribus breviores. Receptaculum nudum. Corollulæ radii copiosæ, ligulatæ, tridenticulatæ, femineæ; stylo conclavato bifido; stigmatibus compressis. Corollulæ disci tubulosæ, quinquefidæ, concolores; columna antherarum & stylo intus parter ejusdem coloris. Pappus setulis, pilosus.

TABULA QUADRAGESIMA SEXTA.

PRIMULA LONGIFLORA.

Primula foliis glabris, ellipticis, rugosis, serratis; floribus umbellatis; tubo longissimo. *Hall. hist. helv. num. 611.*

Primulæ farinosæ varietas Tyrolensis tubo uncialis. *Scop. carn. 1. p. 133*

In alpibus Schleinitzensibus & Marmwaldensibus, nec scio, an alibi? floret Julio. Oculatus in loco ipso nativitatis certis, magno Hallero contradicere debeo; nam flos [illegible] pallide & aquose rubellus, sed qui siccatus, aut intra libros compressus, imo quandoque vix dum ex ipsis alpibus domum allatus, jam totus evadit violaceus. Adest præterea circum fauccm planam albamque circellus flavus. Denique & folia subtus, & plicæ calycis, pulvere albo, licet parcius, adspersa tamen. Est tamen a Primula farinosa species diversa. Radix parva, una cum fibris alba. Folia rosarum radicalia, copiosa, obtuse sublanceolata, in petiolum velut decurrentia, aquose virentia, ambitu serrata, supra nuda, subtus pallidiora,

ra, & inspersa parcius farina albida, quæ se demum perdit. Scapus spithamæus, teres, lævis, spicæ umbellam florum, in florescentia nutantem semper, sustinet. Involucrum umbellæ tot fere squamarum aut bractearum, quot pedunculi florentes adsunt; suntque illæ lineari-lanceolatæ, fere semiteretes, subulatæ, & pedunculis breviores. Flores a duobus ad sex, raro plures, subæquales, singuli pedunculis teretibus, lævibus, omnibus in florescentia versus unam partem nutantibus, & involucro quidem, at non tubo floris, longioribus, instruuntur. Calyx oblongus, tubuloso-semiquinquefidus, quinquangulus cum pluri farina alba inspersus; laciniis subulatis. Corolla infundibuliformis, tubo elongato, calyce bis terque excedente, extus pallide rubello, intus albo & staminis quinque brevis affixa habente, quorum antheræ oblongæ, acutæ, flavæ sunt. Limbus parvulus, planus, quinquepartitus; laciniis obverse cordatis, fauce alba, coronula aut circello flavo coronata. Odorem non observavi ullum. Flores in fructum abeuntes eriguntur. Germen globosum, stylo stamina attingente, stigmate capitato. Flos senescens violaceus. W.

TABULA QUADRAGESIMA SEPTIMA.

SEDUM HISPANICUM *Linn. syst. pag.* 317

Sedum hispanicum: folio glauco, acuto; flore albido. *Dill. elth. pag.* 342. *tab.* 256. *fig.* 332

In alpibus Lithopolitanis Carniolæ, Ebriacensibus Carinthiæ, item in Weichenau, Koralpen, & famigeratissima illa ex tot auctoribus fabella Kaisersburg. Cespitose crescere solet, more gentis. Caules erecti, eundem, quum longiores sunt, suo & cymæ florentis pondere decumbunt. Ramos iidem quandoque ex inferioribus partibus agunt. Cæteroquin teretes, leves, glauci, basin versus rubescentes, apice in cymam vulgo trifidam, sed & nonnunquam quadrifidam, ex centro acutum divergentem, abeunt. Folia, per æstatem falcem, undique sparsa, semiteretia, subulata, succi plena, nonnihil erecta, lævia, glauca, non ipsa basi sed latere interiore cauli leviter adnata, ut adeo, licet sessilia, basi tamen libera sint. Flos in centro cymæ solitarius, subsessilis. Calyx exiguus, quinquefidus vel sexfidus, colore & natura foliorum. Corolla regulariter pentapetala, frequenter etiam hexapetala; petalis lanceolatis, aut ovato-acuminatissimis, supra medium canaliculatis, niveis, & subtus dorso medio linea rosea pictis. Stamina dupla plura quam petala, alterna breviora, alterna petalorum basibus affixa, corollam haud excedentia; filamentis albis subulatis; antheris rubris, tandem nigris, polline albo. Nectaria in germina numero pendentia; illa emarginata; hæc ovato-acuminatissima, conniventia, tandem in rosam divergentia. Capsulæ subcimbiformes, supra longitudinaliter canaliculatæ & dehiscentes. Vidi etiam petala septem & octo. Tota cyma levissime pubescit, ut villi ope exprimi non potuerint. W.

TABULA QUADRAGESIMA OCTAVA.

CYTISUS PURPUREUS. *Scop carn.* 2. *p.* 69. *t.* 43.

Cytisus glaber, siliqua angusta. *Bauh. hist.* 1. *part.* 2. *pag.* 373?

Figura citati Joannis Bauhini, etiamsi haud optima, vix in aliam quam in nostri hujus Cytisi speciem cadere potest, nisi de novo forte quodam mihi haud cognito Cytiso egerit. Descriptio ejusdem ex ramo transmisso sicco talis est, ut certi inde nihil erucre liceat. De floris colore altum silentium. Quæ subjunxit de fratre Caspare, deque dato ab hoc plantæ transmissæ nomine, manifeste indicant Cytisum sessilifolium Linnæi, ut hic contradicat prorsus figuræ & descriptioni. Unde Bauhini synonymum dubium manet. Anno 1761, cum Goritiæ Professor Matheseos publicus essem, versus finem Aprilis, Salcanum, ad pedem Montis sancti situm pagum, concessi, eo potissimum fine, ut plantas quærerem. Multas inter, eas elegantes, quam raras, tum in monte ipso, tum in ripa Lisoncii, inveni & Cy-

tu-

ciſum hunc, quem a florum colore purpureum dixi; & primum quidem ad rupes lateris læ- vi hujusce fluvii prope molam ſalvatoriam penes trajectum; tum altera vice circa medium menſis Maji, ſemiborio ultra Salcanum in eodem Leſoncii latere ad fonticulum limpidiſſimæ aquæ, vulgo Meczlinc dictum. Annis deinde inſequentibus 1762 & 1763, Labaci in Carniolia Philoſophiam publice prælegens, repetitis vicibus obvium habui. Septima Maji in ſuperioribus montis Großgallenberg ipſa in via ad rupes ſiniſtras; decima octava Maji vero in ſilvula ante Savum fluvium, via, qua in Loſthal itur. Denique vigeſima nona Junii Punc- tuſchiz, quod prædium Baronis a Wolkensberg, in pratis Savo additis, &, quantum memini, Scherian dictis, atque hic quidem abundantiſſime. Cum amiciſſimo dom. Scopoli, Medico Idrienſi, communicavi, qui ſiceri Floræ Carniolicæ editioni inſtabat cum addita icone, quo quidem cum minus eſſem contentus, nuper ad cl. Hacquet, Chirurgiæ profeſſorem Labacenſem, ſcripſi, indicatisque loco & tempore florescentiæ eundem rogavi, ut ad me recens evulſam plantam per curſorem publicum transmittere vellet, quod vir humaniſſimus cum feciſſet, illico pingendam curavi. Determinari poſſet Cytiſus floribus ſolitariis, lateralibus, leguminibus mutilis, compreſſis, ſubfalcatis. Deſcriptio eſt ſequens. Planta aſſurgentula & perennis radicem habet lignefcentem, ramoſam, ex brunneo fuſcam; ex qua complures caules, pennæ anſerinæ craſſitudine, teretes, glabri, brunneſcentes, etiam ex rubro fuſci, & velut lignescentes, ac longi, exoriuntur, perque terram proſtrati decumbunt. Annotini hi caules anno ſingulis novos edunt vimineos ſurculos ſive cauliculos, eosque graciles, teneros, molles, ex proximitate adſcendentes, nec ſimplices demittunt, verum & ipſos perſæpe ramoſos, non niſi prima in ætate ſericea pube leviter adſperſos, ſed demum glabros. Rami quidam præcoſe ſpinuli ſunt; alii tantum imul & floribus onuſti. Folia ſparſa, alterna, ternata, in ſpice peri in pares & plura tanquam axe communi ſeſſilia, ovata, ſemiuſcula, plana, tenera, ſaturo viridi, integerrima; ſubtus candido ſericeo pube ſericea proſtrata ſed parum viſibili notata: ſupra, etiſ, eorum pube nonnulla conſpicitur, tamen hæc brevi deperdita, nuda & glabra. Flores axillares, ſolitarii, (raro in folio paupri prope Punctuſchiz ex trinos axillis binis) erecti, excedentes pediculo folium ſubſeſſilium haud excedenti. Calyx monophyllus, cylindraceus, labiatus, ex apice viridi rubellus, primum ex pube ſericea villoſulus; labio ſuperiore labi vexillo, breviore & bidentato; inferiore autem carinæ reſpondente, paulo longiore, ovato, acuto, integro, ac præciſe communi ipſo medio. Corolla papilionacea, magna, intenſe rubra. Vexillum obcordatum, emarginatum, baſim ſtipitem velut productum ſemicylindricum, album, lateribus villoſa, ciliata. Alæ oblongo-ovales, integræ, conniventes, velum, obtuſiolæ, poſtmodo albæ, ora villoſa & ciliata. Carina bipes, naviculare, adſcendens, obtuſa, oris baſeos villoſo ciliatis. Filamenta decem, omnia usque ad baſin in cylindrum connata. Antheræ aurantiacæ, alternæ nonnihil altiores. Germen lineare, anguſtum, nudum, nec niſi quandoque ſubtiliſſime pubeſcens, viride. Stylus oblique adſcendens, albus. Stigma ſimplex. Legumen baſi multo anguſtius, tanquam pedunculatum, & ipſum lineare, compreſſum, ac initio falcatum ſubfalcatum, nudum, tandem atrum, ora margines utrinque per maturitatem repando-emarginata, uniloculare, bivalve, polyſpermum. Odor plantæ nullus. Vigeſima ſecunda Julii 1762 ex monte Großgallenberg legumina retuli pubeſcentia. Forſan aër in loco edito aſperior illi hoc contribuerat; alias enim legumina, etiam adhuc immatura, nuda glabra & levia inveni. W.

TABULA QUADRAGESIMA NONA.

ONONIS ROTUNDIFOLIA. *Linn. ſyſt. pag. 479.*

Anonis foliis ſubrotundis, ſerratis, petiolatis, floribus pedunculatis, petiolis multifloris. *Hall. hiſt. helv. num. 357.*

Cicer ſylveſtre verius. *Lob. ic. 2. 73.*

Cicer ſylveſtre certium. *Dod. pempt. 4. l. 2. c. 15.*

Cicer sylvestre latifolium triphyllum. *Bauh. pin.* 347.
Cicer sylvestre trifolium. *Bauh. hist.* 2. *pag.* 295

Floret a Majo ad Julium in subalpinis Leontinis fruticosa & perennis planta. Radix lignescens, fere brachii crassitudine, sed brevior, ramosa, ramis fusiformibus, radiculis fenium instar instructa. Caput radicis crassum effundit cespitem caulium numerosorum ex procumbente erectorum. Caules inæquales, spithamæi, nonnunquam & cubitales, fistulosi, teretes, striati, ex viridi subrubentes, villosi, ac nonnihil viscosi. Folia alterna, ternata, rotunda, undique crenata, crassiuscula, saturate viridia, paruumper viscosa, villosa, suspensa circa apicem ex petiolo communi longo terete & pubente; foliola lateralia sessilia, impare petiolato. Stipulæ mansuetæ, semicirculares, subcrenulatæ, strictæ, amplæ, villosæ, amplexicaules. Pedunculi axillares, longi, foliis subæquales, teretes, villosi, aphylli, apicem versus uniflori, nonnunquam biflori, & rarissime unicum vel quatuor flores gerentes. Flores initio nutantes ex brevibus pedicellis, lanceolatas bracteas brevissimas, canaliculatis, oblongo-ovatis, integris, subhirsutis. Calyx tubuloso-turbinatus, subcompressus, striatus, villosus, ex viridi-rubescens; fauce effusa, quinquedentata: dentibus subæqualibus, villosis, reliquo calyce longioribus, lineari-setaceis. Vexillum ex albo roseum, striis saturatioribus pictum, integrum, sursum incurvum, lateribus leviter revolutis, amplum, supra per unicolorem pubens. Alæ oblongo-ovales, integræ, extus convexæ, conniventes, albæ cum exigua rosei tinctura. Carina curva adscendens, in rostrum longiusculum & recte acuminata, basi alba, medio rosea, apice ex albo flavescente. Stamina diadelpha, alba; antheris flavis. Legumen compressum, villosum, lanceolatum, nutans, polyspermum. Odorem non observavi. W.

TABULA QUINQUAGESIMA.

PHYTEUMA COMOSUM. *Linn. syst. pag.* 163.
Rapunculus alpinus corniculatus. *Bauh. prodr.* 33. *t.* 33. *pin.* 113.
Trachelium minus petræum. *Pon. bald. p.* 70. *Barr. ic.* 889.
Campanula sphærocephalos perventusta, foliorum ad oras insigniter denticulata. *Plucn. alm. pag.* 77. *tab.* 152. *fig.* 6.

Malborgetti e rupibus vallis frigidæ, quæ torrens Malborgettanus ecrumpit, floret in fine Junii & initio Julii. E fissuris cacuminum parietum, permodica replens terra, radix exit perennis, haud magna, fibris instructa, multiceps. Caules ne spithamam quidem longi, a pondere capitulorum fere prostrati, teretes, substriati, leves, glaucescentes, simplicissimi. Folia radicalia complura, longe petiolata, subrotundo-cordata, inæqualiter ampliter dentata, plana, venosa, lævia, ad per oras dumtaxat piloso-ciliata, supra subtusque ex virore incano glaucescentia. Caulina vero & ipsa frequentia, undique sparsa, oblonga, ovato-lanceolata, inferiora petiolata, reliqua subsessilia, cæterum radicalibus similia. Flores copiosi, speciosissimi, in capitulum terminale collecti inter folia nonnulla reliquis similia, [illegible] angustiora, pedunculo brevissimo instructi singuli, sub bracteola fere subulata. Germen inferum, nudum, erectum, turbinato-quinquangulum, loculare. Calyx germen coronans, dentibus quinque subulatis stellæ instar patentibus. Corolla inverse pyriformis, ovato-acuminata, facie cucurbitæ lagenariæ, monopetala, tandem quinquefariam ab uno sursum dehiscens, germini intra calycis dentes adnata, sessilis, basi inflata, attenuata in cylindrum corniculatum aut rostratum, apice quinquedenticulatum. Color partis inferioris corollæ cælestinus, superioris vero seu colli ex rubro atroviolaceus. Stamina quinque alba, basi ipsi corollæ adnata, versus stylum arcuata. Antheræ oblongæ, flavescentes, filamentis adnatæ. Stylus longissimus, violaceus, pubescens, ultra corollæ rostrum prominens, ac in duo plerumque, vel tria, stigmata spiraliter revoluta divisus. Odor nullus. Planta lactescit. W.

IN-

INDEX.

A.

Achillea atrata . . . Tab. 77
— — Clavennae . . . 76
— — moschata . . . 35 *
Aconitum Anthora . . . 332
— — Cammarum . . . 424
— — Lycoctonum . . . 330
— — Napellus . . . 332
Adonis apennina . . . 44
— — flammea . . . 355
— — vernalis . . . 356
Agaricus alliaceus . . . 93
— — niveus . . . 255
— — olfactus . . . 264
— — phalloides . . . 41
Allium angulosum . . . 473
— — flavum . . . 247
— — multibulbosum . . . 10
— — Victorialis . . . 216
Althaea cannabina . . . 291
— — hirsuta . . . 170
Alyssum calycinum . . . 338
— — montanum . . . 32
Anagallis tenella . . . 6
Andropogon Ischaemum . . . 354
Androsace elongata . . . 330
— — lactea . . . 333
— — maxima . . . 331
— — villosa . . . 332
Anemone alpina . . . 85
— — narcissiflora . . . 149
Anthemis alpina . . . 30 *
— — aethiaca . . . 444
Anthericum ossifragum . . . 351
— — serotinum . . . 34 *
Anthyllis montana . . . 354
Antirrhinum alpinum . . . 58
— — genistifolium . . . 344
Arabis bellidifolia . . . 100
— — pumila . . . 251
— — Turrita . . . 41
Arenaria cruciata . . . 290
— — fasciculata . . . 152
— — laricifolia . . . 372
— — linifolia . . . 445
— — verna . . . 494
Aretia alpina . . . 38 *
Arnica Doronicum . . . 92
— — scorpioides . . . 249
Artemisia rupestris . . . 100
— — glacialis . . . 15 *
— — pontica . . . 65
— — spicata . . . 34 *
Aster alpinus . . . 82
— — Amellus . . . 475
Astragalus aristatus . . . 195
— — Cicer . . . 254
— — montanus . . . 147
— — Onobrychis . . . 38
— — pilosus . . . 51
Astrantia carniolica . . . 10 *
— — Epipactis . . . 11 *
Athamanta Cervaria . . . 69
— — cretensis . . . 62
— — Libanotis . . . 352
— — Meum . . . 303
— — Oreoselinum . . . 68
Atragene alpina . . . 247
Atropa Belladonna . . . 309

B.

Betonica Alopecuros . . . 98
Biscutella laevigata . . . 319
Boletus [illegible] . . . 304
— — [illegible] . . . 172
— — rugosus . . . 169
Brassica Erucastrum . . . 351
— — orientalis . . . 358
[illegible] . . . 199
Bunias Erucago . . . 340
Buphthalmum salicifolium . . . 370
Bupleurum falcatum . . . 145
— — Gerardi . . . 254

C.

Cacalia alpina . . . 234
— — tomentosa . . . 216
Campanula alpina . . . 125
— — pulla . . . 161
— — spicata . . . 190
— — thyrsoides . . . 411
Cardamine bellidifolia . . . 21 *
— — italica . . . 37
Carduus acanthoides . . . 249
— — canus . . . 42 & 43
— — defloratus . . . 89
— — carlinoides . . . 171
— — mollis . . . 18
— — Personata . . . 348
— — pratensis . . . 91
— — serratuloides . . . 127
— — tataricus . . . 90
Carex praecox . . . 446
Carpesium cernuum . . . 264
Carum Carvi . . . 343
Caucalis daucoides . . . 357
— — grandiflora . . . 54
Centaurea montana . . . 351
— — paniculata . . . 320
Cerinthe alpina . . . 124
Chaerophyllum aromaticum . . . 150
— — — aureum . . . 64
— — — latifolium . . . 63
— — — [illegible] . . . 345
— — — sylvestre . . . 147
— — — temulum . . . 8
Chrysanthemum alpinum . . . 75
— — — [illegible]moides . . . 74
Cherleria sedoides . . . 314
Chondrilla juncea . . . 427
Chrysanthemum corymbosum . . . 379
Cineraria cordata . . . 176 & 177
— — crispa . . . 178
— — integrifolia . . . 179 & 180
— — longifolia . . . 181
Cistus Fumana . . . 243
— — canus . . . 277
— — oelandicus . . . 199
Clematis erecta . . . 291
— — integrifolia . . . 163
— — Vitalba . . . 303
Cochlearia Draba . . . 315
Conium maculatum . . . 156
Convallaria latifolia . . . 232
Convolvulus Cantabrica . . . 296
Coronilla coronata . . . 98
— — minima . . . 272

Cratægus Chamæmespilus	231
— — [illegible]	252
— — Oxyacantha	253
— — torminalis	443
Crepis [illegible]	441
Crocus vernus	35 *
Cyclamen europæum	431
Cyperus pannonicus	6 *
Cytisus austriacus	21
— — capitatus	13
— — laburnum	105
— — nigricans	157
— — purpureus	45 *
— — [illegible]	20

D.

Daphne Cneorum	426
— — Laureola	191
Dentaria enneaphyllos	216
Dianthus alpinus	54
— — [illegible]	13
Dictamnus albus	425
Digitalis [illegible]	57
Dipsacus [illegible]	401
— — [illegible]	345
— — [illegible]	417
Doronicum [illegible]	110
— — [illegible]	400
— — Pardalianches	220
Draba aizoides	111
— — hirta	432

E.

Echium altissimum	36 *
— — rubrum	3 *
Erica carnea	22
Eryngium campestre	155
— — planum	153
Erysimum cheiranthoides	23
— — hieracifolium	71
— — repandum	22
Erythronium dens canis	9
Evonymus latifolius	259
— — verrucosus	47
Euphorbia carniolica	24 *
— — cyparissias	415
— — epithymoides	344
— — falcata	331
— — Gerardiana	436
— — platyphyllos	176
— — saxatilis	145
— — segetalis	457
— — sylvatica	175
Euphrasia lutea	198

F.

Ferula nodiflora	5 *
Fritillaria Meleagris	12 *

G.

Galanthus nivalis	362
Galium [illegible]	50
— — glaucum	51
— — rotundifolium	94
— — sylvaticum	422
Genista pilosa	108
— — sagittalis	100
Gentiana acaulis	135
— — asclepiadea	124
— — campanulata	29 *
Gentiana ciliata	111
— — cruciata	172
— — pannonica	125
— — pumila	3.3
— — punctata	28 *
Geum montanum	373
— — reptans	22 *
Gnaphalium Leontopodium	45
Gypsophila paniculata	1 *
— — repens	467

H.

Hedysarum obscurum	125
— — Onobrychis	223
Heliotropium europæum	157
Helleborus [illegible]	222
— — niger	200
— — viridis	106
Heracleum [illegible]	176
— — [illegible]	61
— — [illegible]	172
— — Sphondylium	174
Herniaria [illegible]	347
— — glabra	373
Hieracium alpestre	191
— — aurantiacum	412
— — chondrilloides	419
— — [illegible]	189
— — [illegible]	257
— — [illegible]	41 *
— — molle	119
— — [illegible]	153
— — porrifolium	255
— — [illegible]	351
— — villosum	57
Hyacinthus comosus	125
— — racemosus	157
[illegible]	258
[illegible]	259
[illegible]	260
Hyssopus officinalis	264

I.

Inula Britannica	19 *
— — [illegible]	152
— — germanica	154
— — hirta	338
— — oculus Christi	223
Iris germanica	2
— — pumila	1
— — sibirica	3
— — spuria	4
— — variegata	5
Isopyrum thalictroides	161
Juncus Jacquini	221

L.

Lathyrus [illegible]	250
Laserpitium aquilegifolium	147
— — [illegible]	146
— — prutenicum	117
— — [illegible]	41 *
— — Siler	245
Lavatera thuringiaca	318
Leontodon alpinum	53
— — [illegible]	164
Leonurus Marrubiastrum	405
Lepidium alpinum	337
— — perfoliatum	346
— — petræum	331
Leucoium æstivum	365
— — vernum	222

Le

Lichen [illegible] . . . 374
Lapathum [illegible] . . . 4[illegible]
— — [illegible]gemmiferum . . . 15 *
Laserpitium [illegible] . . . 1[illegible]
— — [illegible] . . . 4[illegible]
— — [illegible] . . . [illegible] *
Linum [illegible] . . . 1[illegible]
— — [illegible] . . . 4[illegible]
— — [illegible] . . . 2[illegible]
— — [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . 2[illegible]
Lithospermum purpureocaeruleum . . . 14
Lonicera alpigena . . . [illegible]
— — Caprifolium . . . 1[illegible]
— — caerulea . . . [illegible] *
— — [illegible] . . . [illegible]
Loranthus [illegible] . . . [illegible]
Lotus [illegible] . . . [illegible]
Lycoperdon [illegible] stellatum . . . [illegible]
— — [illegible] . . . [illegible]
Lycopodium [illegible] . . . [illegible]
Lysimachia [illegible] . . . [illegible]
Lysimachia punctata . . . 1[illegible]
Lythrum Hyssopifolia . . . [illegible]
— — virgatum . . . 7

M.

Marrubium [illegible] . . . 168
Melissa [illegible]phyllum . . . [illegible]
Me[illegible] . . . 4[illegible]
Mespilus Amelanchier . . . [illegible]
Mesembryanthemum [illegible] . . . 419
Mucor [illegible] . . . 2[illegible]
Myagrum [illegible] . . . [illegible]
— — perenne . . . 4[illegible]
— — [illegible] . . . [illegible]

N.

Nepeta [illegible] . . . 24
— — [illegible] . . . 129

O.

Oenanthe [illegible] . . . 364
Ononis [illegible] . . . 2[illegible]
— — [illegible] . . . [illegible] *
Ornithogalum [illegible] . . . [illegible]
Orobus [illegible] . . . 1[illegible]
— — [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . 45
— — [illegible] . . . 266
— — [illegible] . . . 264
— — [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . [illegible]
Ornithogalum [illegible] . . . 308
— — — pyrenaicum . . . [illegible]
— — — umbellatum . . . [illegible]
Orobanche [illegible] . . . [illegible]
Orobus pannonicus . . . 39

P.

Paederota caerulea . . . 39 *
Papaver alpinum . . . 83
— — dubium . . . 23
Pedicularis foliosa . . . 139
— — incarnata . . . 140
— — [illegible] . . . 2[illegible]
— — [illegible] . . . 305
— — verticillata . . . 208

Peltaria alliacea . . . 183
Peucedanum alsaticum . . . 72
— — Silaus . . . 18
Peziza coccinea . . . 163
— — [illegible] . . . 166
Phalangium [illegible] . . . 56
Phleum [illegible] . . . 7 *
Phyteuma [illegible] . . . 52 *
— — [illegible] . . . 417
Pimpinella [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . 367
— — pumila . . . 38
— — Saxifraga . . . [illegible]
Polycnemum arvense . . . [illegible]
Polygonum [illegible] . . . 412
— — [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . 413
Potentilla [illegible] . . . 115
— — [illegible] . . . 116
— — [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . 25 *
— — recta . . . [illegible]
— — [illegible] . . . 114
— — [illegible] . . . 405
Prenanthes purpurea . . . 327
— — [illegible] . . . 9
Primula Auricula . . . 415
— — [illegible] . . . 4 *
— — glutinosa . . . 39 *
— — integrifolia . . . 327
— — longiflora . . . 45 *
— — minima . . . 471
— — [illegible] . . . 27 *
Prunella grandiflora . . . 377
— — [illegible] . . . 378
P[illegible] . . . 277
Py[illegible] . . . 342
— — [illegible] . . . 167

R.

Ranunculus alpestris . . . 115
— — [illegible] . . . 45
— — [illegible] . . . [illegible]
— — [illegible] . . . 325 & 326
— — [illegible] . . . [illegible]
Reseda Phyteuma . . . 113
— — [illegible] . . . [illegible]
Rh[illegible] . . . [illegible]
Rh[illegible] Chamaecistus . . . 327
— — — ferrugineum . . . [illegible]
— — — hirsutum . . . 65
Rh[illegible] . . . [illegible]
Ribes alpinum . . . 47
Rosa [illegible] . . . 279
— — [illegible] . . . [illegible]
— — pumila . . . [illegible]
— — rubiginosa . . . 58

S.

Salix arbuscula . . . 459
— — fusca . . . 409
— — serpyllifolia . . . 295
Salsola prostrata . . . 294
Salvia Aethiopis . . . 211
— — austriaca . . . 112
— — silvestris . . . 212
Saponaria ocymoides . . . 21 *
Satyrium Epipogium . . . 64
— — [illegible] . . . 367
— — nigrum . . . 368
— — repens . . . 369
Saxifraga Aizoon . . . 438
— — androsacea . . . 389
— — aspera . . . 32 *

Saxifraga caesia . . . 374
Scabiosa ochroleuca . . . 410
— — sylvatica . . . 162
Scandix Anthriscus . . . 164
— — Cerefolium . . . 300
— — nitida . . . 46
— — odorata . . . 37 *
— — Pecten . . . 263
Scilla amoena . . . 218
— bifolia . . . 117
Scirpus romanus . . . 448
Scorzonera humilis . . . 26
— — laciniata . . . 550
— — parviflora . . . 303
— — purpurea . . . 56
Sedum atratum . . . 8
— — Telephium . . . 47 *
Selinum sulbacum . . . 21
— — Carvifol : Chabrae . . . 77
— — — Lucasi . . . 16
— — sylvestre . . . 152
Sempervivum arachnoideum . . . 42 *
— — globiferum . . . 42 *
— — hirtum . . . 12
— — montanum . . . 42 *
Senecio abrotanifolius . . . 79
— — Doria . . . 195
— — Leucanthemum . . . 45 *
— — nemorensis . . . 184
— — Saracenicus . . . 196
— — incanus . . . 275
Serratula pygmaea . . . 440
Seseli annuum . . . 55
— glaucum . . . 144
— Hippomarathrum . . . 142
Sideritis montana . . . 434
Silene alpestris . . . 96
— — conica . . . 253
— — pumilio . . . 3 *
— — quadrifida . . . 225
Sinapis pyrenaica . . . 262
Sisymbrium columnae . . . 333
— — Irio . . . 323
— — Loeselii . . . 324
— — Strictissimum . . . 294
Sium angustifolium . . . 67
— Falcaria . . . 257
— latifolium . . . 96
— repens . . . 260
Soldanella alpina . . . 14
Sorbus domestica . . . 447
Stachys annua . . . 360
— — germanica . . . 319
— — recta . . . 559
Swertia perennis . . . 243
Symphytum tuberosum . . . 225

T.

Teucrium supinum . . . 457
Thalictrum aquilegifolium . . . 318
— — angustifolium . . . 421
— — majus . . . 422
— — minus . . . 419
Thesium alpinum . . . 415
Thlaspi alpinum . . . 215
— — montanum . . . 217
— — perfoliatum . . . 317
— — saxatile . . . 215
Thymus alpinus . . . 97
Tordylium Anthriscus . . . 301
— — maximum . . . 142
— — nodosum . . . 24 *
Tozzia alpina . . . 165
Tragopogon minor . . . 23
Trifolium alpestre . . . 433
— — [illegible] . . . 372
— — ochroleucum . . . 49
— — rubens . . . 365
Tussilago alpina . . . 246
— — discolor . . . 147
— — sylvestris . . . 12 *

V.

Valeriana elongata . . . 330
— — montana . . . 269
— — saxatilis . . . 267
— — tripteris . . . 256
Veratrum album . . . 315
— — nigrum . . . 315
Verbascum phoeniceum . . . 314
Veronica multifida . . . 319
— — Pseudochamaedrys . . . 60
— — urticaefolia . . . 59
Viburnum Lantana . . . 341
Vicia Gerardi . . . 229
— pannonica . . . 34
— pisiformis . . . 364
— serratifolia . . . 3 *
Viola alpina . . . 242

X.

Xeranthemum annuum . . . 353

Qui numeri stellulam appositam habent, Appendicis tabulas indicant.

T. 401.

T. 403.

T. 404.

T. 405.

T. 406.

T. 407.

T. 408.

T. 409.

T. 412.

T. 413.

T 114.

T. 415.

T. 410.

T. 417

T. 418.

T. 429.

T. 420.

T. 481.

T. 422.

T. 423.





T. 424.

T. 425.

T. 426.

T. 429.

T. 130.

T. 431.

T. 432

T. 433.

T. 484.

T. 435.

T. 456.

T. 437.

T. 438.

T. 139.

T. 140.

T. 441.

T. 442.

T. 443.

T. 414.

T. 445

T.448.

T. 449.



T. 150.

A. T. 2.

A. T. 3.

A.T. 4.

A. T. 5.

A T 6.

A. T. 7.

A. T. 9.

A.T. 10.

A. T. ii.

A. J. 12.

A. T. 14.

A. T. 16.

A.T. 18.

A. T. 20.

A T. 21

A.T. 22.

A.J. 23.

A. T. 24.

A.T. 25.

A. T. 26.

A. J. 27.

A. J. 28.

A. T. 30.

A.T. 31.

A. T. 32.

A. T. 33

A.T. 34.

A.T. 35.

A. T. 36.

A. T. 38.

A.T. 40.

A. J. 41.

A. J. 42.

A. T. 43.

A.T. 45.

A.T. 46.

A. T. 47

A.T.48.

A.T. 49.

A. T. 50.